赤芍中芍药苷的分离纯化与结构鉴定

陈立江¹, 段洪云¹, 张胜², 刘洋¹, 刘宇¹(1.辽宁大学药学院, 沈阳 110036; 2.辽宁省药物研究院, 沈阳 110015)

摘要: 目的 建立芍药苷的分离纯化与结构鉴定方法, 有效提高芍药苷的含量。方法 将赤芍用醇水溶液加热回流提取, 用 AB-8 大孔吸附树脂、制备液相等工序进行分离纯化, 通过理化常数及光谱分析鉴定化合物结构, 以 HPLC 测定其含量。结果 该法得到的芍药苷纯度为 95.4%, 总回收率为 81.03%。结论 本工艺具有高效、简便、成本低、回收率高等优点, 是一种良好的芍药苷分离纯化方法。

关键词: 赤芍; 芍药苷; 分离; 纯化; AB-8 大孔吸附树脂

中图分类号: R284.2 文献标志码: A 文章编号: 1007-7693(2011)07-0634-04

Separation, Purification and Identification of Paeoniflorin from *Paeonia Veitchii* Lynch

CHEN Lijiang¹, DUAN Hongyun¹, ZHANG Sheng², LIU Yang¹, LIU Yu¹(1.College of Pharmacy, Liaoning University, Shenyang 110036, China; 2.Liaoning Institute of Medicine, Shenyang 110015, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To establish the method of separation, purifying and identification method of paeoniflorin, and to elevate effectually paeoniflorin content. **METHODS** *Paeonia veitchii* Lynch was extracted with ethanol-water solution, separated and purified by AB-8 macroporous resin and preparative HPLC. The structure was identified on the basis of physical and chemical characters and spectral analysis and quantitatively determined by HPLC. **RESULTS** Paeoniflorin with purity over 95.4%, can be prepared with the total recovery more than 81.03%. **CONCLUSION** High purity products can be obtained with this process which is high-performance, convenient, low cost and high recovery and is a good method of separation and purification of paeoniflorin.

KEY WORDS: *Paeonia veitchii* Lynch; paeoniflorin; isolation; purification; AB-8 macroporous resin

赤芍为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 或川赤芍 *P. veitchii* Lynch 的干燥根^[1], 其主要成分为芍药苷, 成无定形粉末, 具吸湿性, 有镇静、解痉、抗炎、抗应激性溃疡病、扩张冠脉血管、对抗急性心肌缺血以及抑制血小板聚集等多方面的作用, 临床上已试用于治疗冠心病^[2]。

国内外对赤芍的化学成分进行了较多的研究, 但对从赤芍中提取主成分芍药的工艺过程的研究报道却很少^[3-5], 用制备液相分离赤芍中的芍药苷还未见文献报道。由于芍药苷的药理作用比较明显^[6-7], 而且毒性小, 是一种值得开发且具有市场前景的药物。本实验采用醇水加热回流、AB-8 大孔吸附树脂、制备液相等对赤芍进行提取、纯化, 并建立了高效、简便、成本低、回收率高的工艺, 旨在为制备出高效、低毒的心脑血管原料药提供科学依据。

1 仪器与试剂

1.1 仪器

高效液相色谱仪(莱比伦 3500); 色谱工作站(Ezchrom Elite); RE 52-99 旋转蒸发仪(上海亚荣生化仪器厂); 制备液相色谱仪(北京慧德易科技有限责任公司); FW-100 型万能粉碎机(天津斯特仪器有限公司); KQ-5200DB 型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司); DK-SZZ 型电热恒温水浴锅(上海精宏实验设备有限公司); 电热鼓风干燥箱(上海博迅实业有限公司医疗设备厂); JA-1003 型电子分析天平(北京赛多利斯仪器系统有限公司); DZF 型真空干燥箱(巩义市予华仪器有限责任公司); X-4 数字显示显微熔点测定仪(北京泰克仪器有限公司)。

1.2 试剂

赤芍饮片(辽宁普兰店, 经辽宁省药品检验所

基金项目: 辽宁省自然科学基金(20092015); 沈阳市科学技术计划项目(F10-205-1-28); 辽宁大学“211 工程”三期建设项目

作者简介: 陈立江, 女, 教授 Tel: (024)62202469 E-mail: chljl16@163.com

王维宁药师鉴定); 硅胶 H(青岛海洋化工有限公司); 芍药苷对照品(中国药品生物制品检定所, 批号: 110736-200934, 含量为 97.7%); AB-8 大孔吸附树脂(天津南开大学化工厂); 乙腈为色谱纯(山东禹王实业有限公司化工分公司); 水为高纯水; 其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 含量测定方法

2.1.1 色谱条件 色谱柱: Thermo C₁₈ 柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm), 流动相: 乙腈-水(17:83, 磷酸调 pH 3.0), 检测波长: 230 nm, 流速: 1.0 mL·min⁻¹, 柱温: 25 °C。

2.1.2 标准曲线的绘制 精密称取五氧化二磷干燥至恒重的芍药苷 2.04 mg, 置 10 mL 量瓶中, 用甲醇溶解并稀释至刻度, 摇匀, 得对照品溶液。分别精密吸上述溶液 3, 6, 9, 12, 15 μL, 注入液相色谱仪, 记录色谱图。以峰面积(Y)对进样质量(X)进行回归, 得直线方程: $Y=908\ 765X-30\ 610$, $r=0.999\ 7$, 进样量在 0.612~3.06 μg 内与峰面积具有良好的线性关系。

分别做了色谱系统精密度试验、方法重复性试验和溶液稳定性试验, 结果显示 RSD 均<2.0%。

2.2 赤芍饮片的含量测定^[1]

取赤芍粉末 0.5 g, 精密称定后置具塞锥形瓶中, 精密加入甲醇 25 mL, 精密称定, 浸泡 4 h, 超声 20 min, 放冷后再精密称定, 用甲醇补足缺失的重量, 摇匀, 过滤, 精密吸取续滤液 0.5 mL 置 10 mL 量瓶中, 用甲醇定容, 混匀后作为供试品溶液。进样测定, 记录峰面积, 计算得赤芍饮片中芍药苷的含量为 3.42%($n=3$, RSD=0.82%)。

2.3 赤芍的提取工艺

取赤芍的粗粉 200 g, 用 8 倍量的 70%乙醇回流提取 2 次, 每次 1.5 h。过滤, 提取液合并后在 55 °C 以下减压浓缩至浸膏, 称取重量为 64.79 g, 用 HPLC 测得浸膏中芍药苷的含量为 6.54 g($n=3$, RSD=1.21%), 提取工艺芍药苷的转移率: $[6.54\text{ g}/(200\text{ g}\times 3.42\%)]\times 100\%=95.61\%$ 。

2.4 大孔吸附树脂纯化工艺

2.4.1 流动相的优选 参考文献[3, 8-9], 采用 AB-8 型大孔树脂纯化赤芍提取物。取赤芍提取物浸膏 32.85 g, 加蒸馏水溶解成没有团块的溶液, 上已经预处理过的大孔吸附树脂柱(径高比为 1:8), 水洗至 Molish 反应为阴性时, 以 5 倍

量柱体积, 分别用 10%, 15%, 20%, 30%乙醇洗脱, 每 100 mL 分段收集, 测定芍药苷的含量, 结果见表 1。

表 1 不同乙醇浓度洗脱芍药苷的结果

Tab 1 Results of different concentration of ethanol elution on paeoniflorin

乙醇 浓度/%	每份中含量/mg·mL ⁻¹					总量/g
	1	2	3	4	5	
20	0	0	0	0.01	0.02	0.03
30	0.04	0.05	0.08	0.07	0.03	0.27
40	0.09	0.38	0.99	0.49	0.14	2.01
50	0.07	0.15	0.11	0.16	0.09	0.58

比较洗脱物中芍药苷的含量, 结果以 40%的乙醇洗脱为最佳工艺。因此, 笔者采用 5 倍量柱体积 40%的乙醇洗脱。

2.4.2 工艺验证试验 取赤芍提取物浸膏 64.59 g, 加蒸馏水溶解, 离心, 离心液上已预处理过的 AB-8 型大孔吸附树脂柱(径高比为 1:8), 水洗至 Molish 反应为阴性时, 采用 5 倍柱体积的 40%乙醇洗脱, 收集洗脱液, 减压回收至无醇味, 干燥至恒重, 精密称取 9.26 g, 用 HPLC 测得芍药苷的含量为 6.13 g($n=3$, RSD=1.04%), 纯化工艺芍药苷的收率: $(6.13\text{ g}/6.52\text{ g})\times 100\%=94.01\%$ 。

2.5 制备液相的应用

色谱条件: 进样量为 1 mL·次⁻¹; 流动相为乙酸乙酯-95%乙醇(10:1); Quik Sep-50 中压色谱柱(300 mm×16 mm); 检测波长: 230 nm; 流速: 6 mL·min⁻¹。

利用制备液相制备芍药苷是本工艺的关键步骤, 具体操作过程如下: 硅胶 H 用流动相充分浸泡 2 h, 脱气后, 用湿法装制备液相柱。赤芍纯化物(赤芍纯化后得到的物质)干粉 9.16 g, 精密加入甲醇 100 mL, 超声溶解, 用 0.45 μm 微孔滤膜过滤, 精密吸取上述续滤液注入液相色谱仪, 每次 1 mL, 观察色谱图, 当出现芍药苷峰时, 收集并合并流分, 减压浓缩至干, 继续减压干燥至恒重, 得芍药苷干燥品, 精密称取 5.81 g, 芍药苷的收率: $(5.81\text{ g}/6.06\text{ g})\times 100\%=95.8\%$, 芍药苷的总回收率: $[5.81\times 95.4\%/(200\text{ g}\times 3.42\%)]\times 100\%=81.03\%$ 。

2.6 结构鉴定

白色无定型粉末(甲醇); mp 172 °C; 紫外灯(254 nm)下显暗斑, 20%硫酸乙醇溶液显色呈紫褐色。IR(KBr)cm⁻¹: 3 445(OH), 1 716(C=O), 1 600、

1 588(芳环), 1 280(C-O-C); $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CD_3OD) δ : 1.35(3H, s, 10-H), 1.81(1H, d, $J=12.5$ Hz, 3 α -H), 1.95(1H, d, $J=10.8$ Hz, 7 α -H), 2.18(1H, d, $J=12.5$ Hz, 3 β -H), 2.47(1H, dd, $J=10.8$ Hz, 6.5 Hz, 7 β -H), 2.56(1H, d, $J=6.5$ Hz, 5-H), 3.84(1H, d, $J=11.7$ Hz, 6'-H), 3.61(1H, dd, $J=7.5$ Hz, 6'-H), 3.19~3.30(4H, m, 2', 3', 4', 5'-H), 4.5(1H, d, $J=7.5$ Hz, 1'-H), 4.74(2H, s, 8-H), 5.42(1H, s, 9-H), 7.47(2H, m, $J=7.5$ Hz, 3''、5''-H), 7.60(1H, t, $J=7.5$ Hz, 4''-H), 8.04(1H, d, $J=7.5$ Hz, 2''、6''-H)。化合物波谱数据与文献报道^[10-11]一致。因此鉴定化合物为芍药苷。

2.7 HPLC 色谱鉴定纯度

2.7.1 样品溶液的制备 分别精密称取赤芍纯化和制备的芍药苷干燥品各 10 mg 和 4 mg, 置 10 mL 量瓶中, 得样品溶液的储备液。精密量取 1 mL 置 10 mL 量瓶中, 用甲醇定容, 摇匀, 得浓度分别为 0.1 和 0.04 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的样品溶液。

2.7.2 色谱条件的确定 芍药苷对照品(0.03 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$)、赤芍纯化和制备的芍药苷分别进样, 色谱图见图 1 和图 2。图谱上主色谱峰和其他峰分离度好, 芍药苷的保留时间为 9.7 min, 最佳色谱条件见“2.1.1”。

图 1 赤芍纯化物高效液相色谱图

1-芍药苷; 2-芍药内酯苷

Fig 1 Purified Paeoniae of Radix Rubra by HPLC

1-paeoniflorin; 2-albiflorin

2.7.3 样品含量测定 制备的芍药苷进样 20 μL , 得峰面积 A, 测 3 次, 求平均值。通过回归方程计算制备的样品中芍药苷的含量, 结果见表 2。

3 结论

3.1 大孔吸附树脂纯化赤芍提取物

本实验采用了大孔树脂吸附法对赤芍提取物进行了分离纯化, 具有吸附快、解吸率高、吸附

图 2 制备的芍药苷高效液相色谱图

1-芍药苷

Fig 2 Preparation of paeoniflorin by HPLC

1-paeoniflorin

表 2 样品含量测定结果

Tab 2 The assaying results of sample

序号	芍药苷含量/%	平均值/%	RSD/%
1	95.8		
2	95.4	95.4	0.37
3	95.1		

容量大、易洗脱、树脂可再生、节省能源^[12]等优点, 并且获得的产品纯度高, 操作简单, 适用于工业化大生产。

3.2 制备液相的应用

现在国内实验室大多还在沿用传统的常压玻璃柱进行分离, 速度慢, 回收率低, 大量消耗试剂与人力, 而应用制备液相分离得到芍药苷, 速度快, 节省溶剂和时间, 是一种制备芍药苷的好方法。

本实验最后分离得到的芍药苷的纯度为 95.4%, 总回收率为 81.03%, 为芍药苷的分离纯化提供了实验依据。

REFERENCES

- [1] Ch.P(2005)Vol II(中国药典 2005 年版. 二部) [S]. 2005: 109.
- [2] MA S C, DENG S W. Optimizing the conditions for the production of total paeony glycoside(TPG) [J]. Chin Tradit Herb Drugs(中草药), 1998, 29(10): 664-667.
- [3] LIN H C, DING H Y, WU T S, et al. Monoterpene glycosides from *Paeonia suffruticosa* [J]. Phytochemistry, 1996, 41(1): 237-242.
- [4] KOSTOVA I, SIMEONOV M, TODOROVA D, et al. Two acylated monoterpene glucosides from *Paeonia peregrina* [J]. Phytochemistry, 1998, 48(3): 511-514.
- [5] PAN L S, LU X Y, WU P D. Process optimization of paeoniflorin isolation from *Paeonia veitchii* Lynch [J]. Nat Prod Res Dev(天然产物研究与开发), 2006, 18(1): 105-107.
- [6] WU Y M, XU H P, WANG F C T, et al. Protective effects of paeoniflorin on cultured cortical neurons of mice [J]. Chin J

- Pharmacol Toxicol(中国药理学与毒理学杂志), 2002, 16(3): 172-175.
- [7] YE J F, DUAN H L, YANG X M, et al. Anti-thrombosis effect of paeoniflorin: Evaluated in a photochemical reaction thrombosis model *in vivo* [J]. *Planta Med*, 2001, 67(8): 766-767.
- [8] WANG D, LIU Q Y. Study on optimization of preparation of total peony glycoside [J]. *Chin Tradit Pat Med(中成药)*, 2006, 28(9): 1380-1383.
- [9] ZHOU L. Study on extracti on separation and purification of total peony glycoside [J]. *Food Sci Technol(食品科技)*, 2008, 8(9): 152-154.
- [10] LEMMICH J. Monoterpene and coumarin glucosides of *Cnidium silaifolium* [J]. *Phytochemistry*, 1996, 41(5): 1337-1340.
- [11] WANG Y Z, FENG W S, SHI R B, et al. Monoterpenoids constituents of *Radix Paeoniae Rubra* [J]. *Chin Pharm J(中国药理学杂志)*, 2008, 43(9): 669-671.
- [12] HU J, ZHOU Y H. Application of macroporous resin in the purification of Chinese herbs [J]. *Chin Tradit Pat Med(中成药)*, 2002, 24(2): 127-130.

收稿日期: 2010-09-09