

金银花的栽培与管理

叶德松

金银花是重要药材，能清热解毒，有较强的抗菌作用，是防暑降温的饮料。随着医药卫生事业的发展，药用量逐年增加，供不应求。全国产量约一千八百万斤左右，仅占需要量的一半。

金银花适应性强，耐湿、耐旱、耐寒。屋前屋后、山坡地角都可以种植，很有发展前途。

金银花属忍冬科半常绿缠绕灌木。它同一株藤上开放出白如银、黄如金的花朵，采收后，黄的、白的可混在一起，药效一样，所以有“二花”，“双花”、“双宝花”的称号。它的藤和叶也可入药。

繁殖金银花有扦插、压条、分株、种籽繁殖等几种，但以扦插法简便易行，且有成活率高、开花早的优点。金银花的扦插，以在春季雨水季节或立秋前后为宜。要选择生长健壮、无虫害的二至三年生的枝条，剪成一尺二寸左右的插条，按照株距四尺，行距五尺，挖大约一尺至一尺五大小的窝。每窝插四至五根或五至六根，土面露出二至三节，将土填实就可。

金银花插后，要加强管理，把好四关：

1. 中耕除草，培土。可分春、夏、秋三

次进行，其中春秋两季结合培土。

2. 施肥。第一次可在早春中耕除草后，施用堆肥或山泥灰。每窝二十至三十斤；第二次在采收第一次花之后，每窝施人粪十斤左右或适量的化肥。

3. 整枝。早春，适当疏剪过密或过老的枝条，使枝条分布均匀，并搭好支架以利攀缘。总之，使其通风、透光，促其开花。

4. 防治病虫害。在栽培中，要注意防治金银花常见的病害，如忍冬褐斑病、炭疽病和锈病，虫害如芽虫、天牛等。忍冬褐斑病的防治方法：冬春进行整枝修剪，保持植株通风透光，发病初期可用百分之五十苯腈咪唑一千至二千倍喷雾，每隔七天一次，连喷二至三次。炭疽病和锈病的防治方法：加强田间管理，及时修剪枝条，增施肥料，促使植株生长健壮。蚜虫的防治方法：可用烟草一斤加水三十至四十斤浸一昼夜后过滤喷射或用乐果乳剂一斤加水二千斤喷射，但喷射药液一定要在采花前半个月进行。天牛防治方法：可在清明前，天牛将要钻出土面时，用敌敌畏喷施花墩基部，夏秋发现天牛寄生枝条时，可剪下烧掉或往虫孔注药。