

治疗胃病新药——服止宁片

服止宁片主要成分为 Methylbenactyzii Bromidum, 商品名有 Filcilin, Finalin, Spatomac 等。化学名为: 二苯基羟乙酸 2—二乙胺基乙酯溴甲烷季铵盐 (2—Diethylaminoethyl, diphenylglycolate, methobromide)。化学结构式为:



本品白色鳞状结晶, 易溶于水和乙醇, 味苦。

此药于 1949 年由 Blicke 等人合成, Melrille 进行了药理试验, 发现它对副交感神经有阻断作用, 后作为消化性溃疡的治疗

药收载于日本药局方。日本从七十年代就已大量生产, 我国从七四年起进口该药。我厂于 85 年 4 月试制成功, 87 年 4 月投产, 经温州市科委鉴定, 质量达到省版标准, 疗效和日本产服止宁片完全相等。本品作用特点是不易通过血脑屏障, 对中枢神经系统不会引起抑制作用。

用法与用量 常用量为每次 1~2 片, 一日 3 次, 饭后服, 可根据病情调整剂量, 最大量为每次 3 片, 儿童剂量按年龄酌减。

规格 每片 10mg, 每箱 100 片 × 20 并 × 12 盒

生产厂 浙江温州第二制药厂 (批准文号: 浙卫药准字 (85) 1411—1)

(张作成)