

# 维脑路通引起尿潴留 1 例

河南省安阳市灯塔医院偏瘫康复专科 王跃钢

维脑路通注射液是近年来治疗脑血管疾病的一种常用药物。我们临床无论应用其常用量还是超常用量10倍(4000 mg),多年来未见明显毒副作用。引起尿潴留的病例,国内仅见报告<sup>[1]</sup>,笔者近来偶遇一例,现报告如下。

患者马××,女性,70岁。住院号890036于1989年1月14日以右侧肢体功能障碍十余日为主诉入院。10天前自感右侧肢体麻木,继之出现功能障碍,当时无颅压增高征出现。本村医疗室诊断为脑血栓,先后给予应用低分子右旋糖酐、胞二磷胆碱、蝮蛇抗栓酶等药物(在此期间未出现尿潴留)后,肢体功能有所好转。入院4天前因停用药物后肢体功能障碍加重而入院(其它症状无异常)。

入院后查BP170/90 mm Hg,神志清、语言清晰,口角稍向左歪斜,伸舌时舌尖偏右,右侧上下肢肌力0°,右侧巴氏征阳性,双侧霍夫曼阴性。临床诊断为动脉硬化性脑梗塞,给予应用10%葡萄糖注射液500 ml,加维脑路通针(太原第二制药厂,批号861046)400 mg/日静脉滴注,用药后8天出现排尿困难,未在意,第10天出现尿潴留(在此期间仅口服潘生丁、芦丁片),经穴位按压、热敷后未见效,行导尿术后,导出约600 ml尿液。继续应用维脑路通,排尿困难仍未见好转,故停用维脑路通,2天后即自动排尿,尿潴留消失。

## 参 考 文 献

[1] 田海明, 新药与临床1986, 5(4), 203.