

中 药 的 过 敏 反 应

杭州市中医院(杭州, 310006) 高秀英 姜计划 陈红梅

一般认为只有化学药物或生物制品才会发生过敏反应, 而对于中药的过敏反应往往为人们所忽视, 笔者综述了近年来有关中草药过敏反应的报道, 希望引起人们的重视。

一、内服单味中草药所致过敏反应

本文收集由单味中草药(22种)所发生的皮肤或全身性过敏反应共25例, 其中过敏性休克1例, 死亡1例。详见表1。

表1 内服单味中药引起的过敏反应

药 名	例 数	过 敏 反 应 症 状	文 献
乳 香	2	服药后1小时即感胃脘不适, 皮肤微痒, 全身无力, 一剂服完后周身肌肉抽搐, 瘙痒难忍, 全身布满粟粒样红丘疹, 面部红赤, 耳部红肿, 烦躁不安。又一例服药1h患者肠鸣, 腹泻三次, 服第二剂稀水泄10余次, 并呕吐三次。	[1]、[2]
牛 蒡 子	1	服药后30分钟, 突感胸闷气急, 并有喉头阻塞感, 随即头昏呕吐, 皮肤相继出现丘疹, 瘙痒难忍。	[3]
三 七	1	服药第二天即四肢出现许多细小针眼状红色皮疹, 痒, 尤以腕关节处最为明显。	[4]
炮 山 甲	1	四肢及躯干出现散在红疹点, 奇痒。	[5]
连 钱 草	1	服药后至日腹部及上下肢出现红色丘疹, 奇痒难忍, 发热38.1℃, 烦躁, 口干, 双侧颌下淋巴结肿大, 有压痛, 口唇有疱疹, 舌炎红, 有芒刺。	[6]
远 志	1	全身燥热发痒, 皮肤出现细小密集成片红色丘疹, 鼻塞不通, 心悸, 咳嗽加剧。	[7]
丹 参	1	全身发痒, 继而出现散在红疹且感腹胀纳呆, 恶心呕吐, 伴有轻度发热。	[8]
鹿 复 花	1	服药后半小时即感发热, 恶心, 继之全身皮肤出现散在性丘疹, 瘙痒不已。	[9]
续 断	1	服药后很快双手背皮肤出现红色斑块, 奇痒, 且有灼热感。	[10]
防 风	1	上腹不适, 恶心, 随即面部、双手背皮肤出现红色斑块, 奇痒, 伴有心烦, 灼热感, 微出冷汗。	[11]
辛 夷	2	1例服药后1小时即感头昏心慌, 胸闷不适, 恶心, 全身瘙痒。另一例出现荨麻疹。	[12]
皂 刺	1	服药后5分钟即全身大片风疹, 色红, 奇痒。	[2]
蒲 公 英	2	服药后半小时即全身瘙痒, 出现风团。	[13]
白 芍	1	服药后全身皮肤瘙痒难忍, 周身起粟样红丘疹, 面红赤, 烦躁不安	[14]
羚 羊 粉	1	患儿高热不退用羚羊粉0.7g。服后半小时即呼吸急促, 烦躁不安, 哭闹不止, 继后见红点, 融合成片状扩展至全身, 抢救无效, 皮肤紫癜遍布全身, 茄子色, 口流少量鲜血而死亡。	[15]
生天麻粉	1	荨麻疹	[1]
掌 蒴 子	1	过敏性休克	[17]
大果枸杞	1	药热过敏反应	[18]

板 兰 根	1	多形红斑	[19]
马 兜 铃	1	猩红热样麻疹	[19]
何 首 乌	1	药热反应	[19]
延 胡 索	1	药热反应	[20]

二、内服中草药复方制剂(包括中成药、汤药)所致过敏反应

剂均可发生过敏反应。其中过敏性休克 1 例, 详见表 2。

文献报道内服中草药丸、片、冲剂及汤

表 2 内服中药复方制剂引起的过敏反应

药 名	例 数	过 敏 反 应 症 状	文 献
速效救心丸	1	服药后全身瘙痒, 皮肤上出现散在蚕豆粒大小、色鲜红的风疹块。	[21]
冠心苏合丸	1	周身不适, 躯干及皮肤瘙痒, 背部右侧、臀部出现散在风疹块。	[22]
木 瓜 丸	1	全身瘙痒, 头颈、胸、四肢均出现浅红色斑块, 呼吸加快, 烦躁不安。	[23]
鼻 炎 丸	1	服后自觉口周麻木, 发紫, 下午再次服后则周身发痒, 出现大片风团, 双眼刺痒, 恶心, 呕吐, 腹泻。	[24]
磁 朱 丸	1	猩红热样皮疹	[19]
消 肿 丸	1	引起红疹	[25]
四季青片	1	服后约 1.5 小时即出现目眩头重, 恶心欲吐, 坐立不稳	[26]
排 石 汤	1	服后 20 分钟, 自感头晕, 站立不稳, 心慌, 胸闷不适, 恶心, 全身乏力, 次日出现红色皮疹	[27]
麻杏石甘汤	1	荨麻疹	[19]
苣 苳 汤	1	服药后 2 小时面部出现瘙痒, 皮肤渐潮红肿胀, 5 小时左右见少许米粒大丘疹及水泡。瘙痒加重, 轻度灼痛, 10 小时密集小丘疹及水泡, 第二天眼睑明显肿胀	[28]
鼻炎宁冲剂	2	1 例出现荨麻疹, 1 例出现过敏性休克。	[29][30]
云芝肝泰冲剂	1	固定型药疹	[19]

三、中草药注射剂所致的过敏反应

文献中除了肌注“清开灵”、肌注板蓝根与柴胡混合液、单独肌注板蓝根等引起荨麻疹、药疹的报告外, 还有注射中药针剂引起过敏性休克的。如吴氏报导肌注板蓝根针, 第一次时无任何不适, 当日下午注射第二支, 仅 10 分钟左右则患儿突然惊叫, 口吐白沫, 牙关紧闭, 口唇及四肢抽动。诊断过敏性休克^[31], 经抢救好转。引起过敏性休克的还有柴胡针, 复方麝香针等。

静滴丹参针引起过敏性皮疹。静滴复方丹参针 5 分钟患者头皮及左眼部、鼻部、面部发痒, 脸轻度水肿, 诊断为神经血管性过

敏反应^[32]。

四、外用或加工中草药过程所致的过敏反应。

文献报告某些中药膏外涂可引起不同程度的过敏反应外, 甚至在加工过程, 由于接触或吸入中草药粉尘、气味等也可致过敏反应, 详见表 3。

小结

从本文所引资料可见, 无论单味中草药(23种)或复方(包括中成药、汤药)通过口服、外用或注射均可能引起过敏反应, 还有人由于在加工过程中接触中草药粉尘气味而致过敏的情况。本文综述的过敏反应中有 6 例发

生过敏性休克,文献报道,中草药过敏反应中过敏性休克占25.64%^[19],尤其是一例患儿服用羚羊粉致死的沉痛教训。这些资料充

分表明中草药的安全性也必须引起足够的重视。

表3 外用或加工中草药过程引起的过敏反应

药 名	例 数	过 敏 反 应 症 状	文 献
麝香虎骨膏	1	外贴不到1分钟即感耳鸣难忍,两眼发黑,心慌,身体软弱,不能站立。渐至神志不清,面色苍白,头出冷汗,诊断为过敏性休克	[33]
风 油 精	1	外用过敏性休克	[19]
云南白药	1	外用过敏性休克	[19]
威 灵 仙	1	捣烂外敷,约12小时左侧颈部可见9×10cm边缘清楚之树枝状水肿性红斑,其上覆以成簇的针帽大丘疹及小水泡	[34]
桃 仁	1	炮制时因与其接触,先觉手背有刺痛感,继而两手背、面部暴露部位也出现感觉,当患者再次加工桃仁接触5分钟即出现上述反应,同时出现红色疹块	[35]
天 花 粉	2	加工天花粉时,流泪打喷嚏加重,伴有口唇发绀,呼吸急促,全身不适。	[36]
白 芥 子	1	捣烂外敷穴位,初用效好,第二次用时不足4小时,自觉面部灼热疼痛,全身起风块,奇痒难忍,且腹痛隐隐,局部有红肿及水泡,大小不等	[37]
木 香	1	搬运木香引起头晕,胸闷,心烦,周身蚁感等	[38]
鸦 胆 子	4	捣烂外敷引起荨麻疹	[39]
		过敏性休克(2)	[40]
远 志	1	接触远志出现鼻塞不通,轻度发热,周身有难言的不适感觉	[7]

参 考 文 献

- [1] 李 超, 四川中医1987, (5):25
- [2] 肖士杰, 江西中医药, 1987, (5):2
- [3] 吴树忠, 中药通报, 1987, (4):58
- [4] 董嘉德, 中药材, 1989, (9):35
- [5] 丁 木, 四川中医, 1987, (5):19
- [6] 杨 林, 中药通报, 1988, (9):51
- [7] 刘时君, 中成药研究, 1985, (5):44
- [8] 马利杰, 四川中医, 1984, (4):62
- [9] 朱炳林, 中成药研究, 1986, (7):47
- [10] 陈开宗, 四川中医, 1984, (4):25
- [11] 向义廷, 四川中医, 1985, (11):19
- [12] 金 涛, 中药通报, 1986, (8):57
- [13] 别玉溪, 中药通报, 1986, (10):57
- [14] 黄银弟, 四川中医, 1988, (8):26
- [15] 范国文, 四川中医, 1989, (5)封底
- [16] 张志朴, 临床皮肤科杂志, 1984, (3):53
- [17] 杜生敏, 中医杂志, 1983, (12):12
- [18] 祝光礼, 浙江中医杂志, 1985, (11~12):516
- [19] 方大定, 中国医院药学杂志, 1987, (8):380
- [20] 马胜兴, 中西医结合杂志, 1982, (3):169
- [21] 朱波刚, 中成药研究, 1988, (8):45
- [22] 许柏泉, 中成药研究, 1987, (4):45
- [23] 刘立华, 中成药研究, 1987, (6):43
- [24] 田德明, 中成药研究, 1986, (7):46
- [25] 王广见, 中国中药杂志, 1990, (3):53
- [26] 何连成, 四川中医, 1987, (5):48
- [27] 王云翔, 中药通报, 1988, (11):52
- [28] 李沛然, 中药通报, 1986, (12):59
- [29] 胡光志, 四川中医, 1988, (5):56
- [30] 沈云富, 中成药研究, 1988, (19):46
- [31] 吴照平, 四川中医, 1987, (5):48
- [32] 王传勤, 中国医院药学杂志, 1987, (10):457
- [33] 田庆生, 四川中医, 1987, (8):57
- [34] 李玉川, 四川中医, 1985, (11):30
- [35] 傅晋彬, 中成药研究, 1984, (3):46
- [36] 滕瑞卿, 中药通报, 1986, (1):28
- [37] 徐际夏, 山东中医杂志, 1988, (1):25
- [38] 田文艺, 中成药研究, 1985, (9):9
- [39] 郑功泉, 中药通报, 1986, (2):57
- [40] 张玉辉, 四川中医, 1988, (12):15