

藿香正气水致过敏性休克一例报告

贵州省福泉磷肥厂医院 葛天德 吴光艳

患者苏××女20岁,未婚,工人,住院号1986

因上呼吸道感染,给藿香正气水10 ml×3支,系遵义制药厂生产。仅服半支约5 ml时即感不适,而未再服,也未用其他药品。历时约15分钟后,患者觉胸闷,头昏,寒战,呼吸困难,面色略青紫,烦躁不安,出冷汗。无恶心呕吐,也无腹痛腹泻。既往体健,无药物过敏史。

检查:神志清,皮肤未见皮疹与紫斑, T37℃, P120次/分, R38次/分, BP 60/40 mmHg, 心律齐无杂音, 两肺未闻干湿性罗音。腹平软无压痛, 肝脾未扪及, 肠鸣音正常, 神经系统无异常。诊断为藿香正气水致过敏性休克。

立即用0.1%肾上腺素1 ml皮下注射, 非拉根25 mg肌肉注射, 氟美松2 mg+

50%GS 60 ml静推并予吸氧。10% GS 1000 ml+氢化考地松150 mg静滴。血压逐渐回升, 面色好转, 历时约4小时后, 病人完全恢复正常。

一般而言, 临床应用中药或中成药, 很少有出现过敏性休克等严重副反应, 特别是做为春季常用的中成药藿香正气水而发生过敏性休克者, 则国内尚未见有文献报告。本例患者因上呼吸道感染而服用半支藿香正气水后即出现过敏性休克, 经抗休克治疗后好转。因此作者认为在临床应用中药或中成药时, 要警惕其毒副反应, 切不可滥用。

参 考 文 献

- [1] 张炳礼等编医学文选《中毒与药物反应诊断及抢救专辑》134页1985广西医学情报研究所。