

头孢氨苄片致药疹一例报告

武警部队山东省总队医院皮肤科(250001) 王效平 王承军

患者男性, 68岁。因兰尾炎术后1周, 刀口仍有少许渗出而口服头孢氨苄1片(含苯苄青霉素0.125克, 哈尔滨第四制药厂生产), 2小时后感面部灼热、肿胀、瘙痒, 并迅速波及全身, 4小时后全身皮肤出现红斑、丘疹、瘙痒加重, 并伴轻度胸闷、心慌而诊于我科。

体查: 体温37.5℃, 脉搏84次/分, 血压17.3/12 KPa, 面部潮红肿胀, 双眼结合膜充血, 心肺无异常, 腹部轻度压痛, 肝脾肋下未及。皮科所见: 面部、躯干、四肢皮肤弥漫性潮红, 散布米粒至豆大丘疹及风团样皮疹, 表面光滑无屑, 压之退色, 对称分布, 以面部及躯干部为重。实验室检查: WB $C10 \times 10^9/L$ N70, L17, E13。X线检查:

心肺无异常发现。

即停药该药, 给予地塞米松10毫克加入10%葡萄糖液500毫升内静滴, 10%葡萄糖酸钙10毫升静注, 赛庚啶及维生素C等治疗, 3日内皮损及自觉症状全部消退。以后改服麦迪霉素, 未再出现皮损。

讨 论

患者兰尾炎术后曾肌注青霉素1周无不良反应, 改用头孢霉素仅服1片即发生皮疹, 故诊断为药疹无疑。由于头孢氨苄与青霉素类抗生素具有部分交叉过敏, 故本例药疹以头孢氨苄为可能, 且不宜再用青霉素类抗生素, 以避免严重过敏反应之发生。