

口服先锋霉素Ⅶ引起过敏性休克1例报道

第一军医大学珠江医院呼吸内科(广州,510022) 王 钧

患者甘美娴,女,61岁,住院号114029。主因咳嗽、咳痰、气促2年,加重2月,于91年9月5日入院。查体:一般情况好,双肺呼吸音粗,偶闻哮鸣音。胸片示双肺纹理增多、变细、紊乱。肺功能检查提示小气道阻塞性病变。乙酰甲胆碱激发试验阴性。诊为“慢性喘息性支气管炎”,给予洁霉素、庆大霉素、必嗽平、舒喘灵等药物治疗,好转。入院后2周,换用先锋霉素Ⅶ0.5口服,患者服用后5 min,出现恶心、呕吐、剧烈腹痛、便意、面色苍白,全身冷汗、气促明显,双肺布满哮鸣音,心率120次/min,血压由18/12 kPa降至10/7 kPa。立即给予吸氧、多

巴胺、阿拉明、地赛米松等药物救治,1小时后恢复正常。

讨 论

先锋霉素Ⅶ为临床治疗呼吸道感染常用药物。其不良反应主要为阴道白色念珠菌病和血清转氨酶、碱性磷酸酶和乳酸脱氢酶的短暂升高。口服后出现过过敏性休克者国内未见报道。特别值得提及的是该患者既往应用青霉素、先锋霉素Ⅳ未出现过不良反应。我们报告本病例,提醒人们在应用该药物时加以注意,以免严重后果发生。