

静滴氨苄青霉素停药后出现剥脱性皮炎1例

蒋 娜* (广西省来宾县人民医院, 来宾 546100)

韦正步 (广西省来宾县药检所, 来宾 546100)

患者, 男, 36 a, 因患鼻窦炎、支气管炎住院, 给予氨苄青霉素4g加于5%葡萄糖注射液500 ml/d静滴, 连续使用14 d, 鼻窦炎、支气管炎愈痊出院。停药4 d后, 患者躯干、四肢出现斑疹、奇痒症状, 但未发热, 而后出现表皮剥脱, 口服、注射糖皮质激素、抗组胺药均无效, d 2改用黄柏、蛇床子、苦参、大腹皮、白癣皮等中药煎水冲洗, 3 d后患处皮肤呈黑褐色脱落, 痒症减

轻, 经多次脱落, 8 d后恢复正常。

体会 患者自述前一年曾因支气管炎而使用氨苄青霉素, 停药4 d后出现类上反应, 考虑此反应为氨苄青霉素所致。患者对其他青霉素类药物均无过敏史, 使用氨苄前皮试呈阴性, 使用过程中也未出现任何不良反应, 停药几天后才出现剥脱性皮炎, 是否与氨苄青霉素代谢产物或患者特异体质有关, 有待进一步探讨。