

ATP致全身性水肿1例

卢慧勤 (广州军区军医学校训练部, 广州 510315)

李海玲 (广州军区广州总医院四内科, 广州 510000)

患者: 女, 49 a。1991年9月13日因突发性眩晕、恶心、呕吐伴耳鸣入院治疗。未曾用过 ATP, 入院查体无异常, 给予10%葡萄糖注射液 500 ml, ATP 40 mg, V·B₆ 100 mg, V·C 2g, 静脉滴注。次日发现患者颜面部及四肢明显浮肿, 压之凹陷, 尤其是以双下肢小腿下部为甚。查体: 心肺阴性, 心电图正常, 肝功能正常, 血常规, 尿常规均正常, 即停用 ATP, 进行对症治疗。d 3 水肿明显消退, 1 wk 后水肿完全消失, 此后,

再未出现水肿症状。

体会 本例患者无心、肾、肝硬化等疾病史, 应用 ATP 后出现水肿, 体查无其它阳性体征出现, 考虑为 ATP 引起, 故停用 ATP, 水肿消失, 证明该患者全身性水肿可能是应用 ATP 所致。静注 ATP 能引起副反应临床医生应谨慎使用, 发生严重反应后, 应速查心肺, 血压, 根据反应种类, 给予及时正确处理。

收稿日期1992—05—28