

利多卡因致过敏性休克1例

刘 英 骆安奇 (浙江省义乌市人民医院, 义乌 322000)

患儿, 女, 10 a。平素体健, 因正畸拔牙, 牙槽内注射2%利多卡因 3 ml, 2~3min后出现全身发痒, 皮肤潮红, 皮疹, 脸部水肿, 唇绀, 患儿诉胸闷、寒战, 呕吐并逐昏厥, 测血压为0/0 kPa, 立即给予肾上腺素 0.5 mg 肌注, 地塞米松 5mg 静推、10 mg 加入葡萄糖液中静滴, 同时注射 12.5 mg 非那根, 1%葡萄糖酸钙 8 ml 静推, 吸氧, 直至呼吸平稳, 血压为12/8 kPa, 稳定后出院。

体会 该患儿使用利多卡因仅 2~3min 则发生以上症状, 故作者认为可能过敏性休克。利多卡因作用比普鲁卡因快, 强而持久, 安全范围大, 但利多卡因的毒付作用, 皮疹、荨麻疹、支气管痉挛、神经血管性水肿、血压下降以至休克不能轻视。属超速型变态反应 I 型, 若抢救不及时, 可危及生命。因此, 建议儿童有其它药物过敏反应史的, 仍需做过敏试验为安全。

收稿日期: 1993—02—26