

## 洁霉素致过敏性休克1例

章鸿鸣 李云生 (浙江省温岭县第一医院, 温岭 317500)

患者, 男, 18 a。既往体健。因发热、咳嗽、咯痰4—5 d 来院。查体: T 37.9℃。R 22次/min。P 72次/min。Bp 13.30/9.31 kPa。神志清, 呼吸平, 颜面红润, 心律齐, 两肺呼吸音粗糙, 腹平软。血象  $8.9 \times 10^9/L$ 。N 80%。L 20%。胸透: 两肺纹理增粗。诊断: 急性支气管炎。予以洁霉素1.2 mg, 地塞米松 2 mg 加入 5%葡萄糖液 250 ml 静滴, 2 min 后患者感心悸、气促、胸前压迫感、全身发麻, 继面色苍白, 口唇发绀, 四

肢湿冷, 神志不清, 两肺闻及哮鸣音, BP 7.98/5.32 kPa。立即吸氧、停止输液, 皮下注射 0.1% 肾上腺素 1 ml, 静注 10% 葡萄糖酸钙 10 ml。地塞米松 10 mg、维生素 C 2.0 溶于 5% 葡萄糖液静滴。20 min 后患者神志转清, 面色转红润, 心悸、胸闷好转, 心率 84 次/min, 律齐、音中等, 肺部哮鸣音消失, Bp 14.10/10.31 kPa, 观察 2 h, 病情稳定。