

肌注聚肌胞致过敏性休克 1 例

鲁清华 (湖北省孝感地区医院, 孝感 432100)

聚肌胞可增强人体免疫力, 抗御病毒感染, 用于治疗多种病毒性疾患。药典介绍, 大剂量应用聚肌胞时, 少数患者可出现微发热现象, 一般情况下4—8 h内自然消退。而其它不良反应未提及。

患者, 男, 75 a, 因病毒性角膜炎于1992年4月23日在我院肌注聚肌胞2 mg, 注入1.5 mg剩0.5 mg时, 病人突感口唇发麻、胸闷、心慌、气急、紫绀, 出冷汗, 立即停止注射, 助病人平卧, 请医生会诊。患者有冠心病, 胆囊炎病史。体检: 神志清醒, 血压由15/9 kPa下降至8/6 kPa, 手指末端及口唇紫绀。诊断: 过敏性休克。抢救经过: 肌注非那根25 mg, 静脉推注50% GS 40 ml + 地塞米松5 mg, 给氧。考虑病人有冠心病未用肾上腺素。20 min后症状有

所改善, 但起身后又出现上述症状。再次静脉推注50% GS 40 ml + 地塞米松5 mg, 静脉滴注10% GS 500 ml + 肌苷0.4 + 维生素C 2.0, 1 h后, 病人休克症状消失, 呼吸平稳, 血压回升至15/9 kPa, 皮肤, 口唇颜色恢复正常。事后, 用此批号聚肌胞给病人做皮试, 病人皮丘肿大, 呈阳性反应。

体会 此病人应用的聚肌胞是天津生物化学制药厂生产(批号901002, 失效期92年5月), 经查对无过期, 变质, 肌注时按正规无菌操作, 在注射过程中出现过敏性休克反应, 且反应程度严重, 足以引起我们警惕。此病人既往无药物过敏史。引起过敏性休克的机制尚不清楚, 作者也未见聚肌胞引起过敏性休克的文献报道。

收稿日期: 1993—02—23