

头孢唑啉钠诱发血尿1例

徐协新 (江苏省启东市启西中心卫生院, 启东 226222)

患者,男,42 a,因左上腹部外伤,感左上腹剧烈疼痛而抬入本院求诊。以往无外伤手术史,无药物过敏史,无尿结石及血尿史。查体: T 37.2℃, R 22次/min, P 108次/min, BP 12/8 kPa 急性面容,面色苍白,两瞳孔等大等圆。颈软,心肺无异。腹隆,左上腹压痛,轻度肌卫,无反跳痛,脾区叩痛(+),移动性浊音(+).余无特殊。血常规: Hb 9, WBC 13.2×10^9 , N 0.8, L 0.2。“B”超: 脾破裂。肝,肾,胰无异常。入院后,即行剖腹探查,见腹腔内有新鲜血2000 ml,脾门处有-5cm长裂口,肝,胰,肾无异常。行脾切除术。术程顺利。术后用头孢唑啉钠6.0 g 静滴,1次/d。术后d 3,患

者出现全程肉眼血尿,术后d 4停用头孢唑啉钠,血尿即消失,术后d 7,因患者体温达38.5℃,又给予头孢唑啉钠6.0 g 静滴,当天下午,肉眼血尿又复出现,停用头孢唑啉钠后,血尿即消失,至痊愈出院。

体会 头孢唑啉钠属第一代头孢菌素类抗菌素。对生长期细菌的细胞壁合成有阻断作用。具有抗菌谱广,抗菌效力强,且价格相对低,毒付作用小而在基层医院广泛应用。阅查资料未发现其引起血尿之报导。因此作者认为应用该药时应注意: 1.肾功能不全时慎用。2.年龄大于50 a 适当减量。3.剂量不宜偏大,以6.0 g/d 为宜。

收稿日期: 1993—03—27