

西力欣致高热及三叉神经痛1例

马慧芬 (绍兴市人民医院, 绍兴 312000)

何解生 (绍兴市妇幼保健院, 绍兴 312000)

患者, 男, 48 a, 因突发性咽痒, 胸闷, 咯血, 初诊断为支气管扩张咯血, 予以止血, 抗炎治疗, 未见明显好转, 后来我院就诊, 查体: 体温 37°C 呼吸 18 次/min, 脉搏 70 次/min, 血压 16/18 Kpa, 肝脾未及, 二肾区无叩痛, 食欲正常, 大、小便无殊, 睡眠也可, 无肝炎、结核、外伤史。

患者自诉胸闷, 有间歇性咯血, 立即给予 0.9% 氯化钠 500ml 加青霉素钠 480 万 u 及 5% 葡萄糖氯化钠 500ml 加丁胺卡那 0.4 g, 静滴, 1 次/d, 治疗 1 wk, 疗效不明显。改用 0.9% 氯化钠 60ml 加西力欣(西力欣为英国葛兰素集团制造, 批号: FEB1992) 1.5 g, 静推, 1 次/12 h, 第一次用药后约

20min, 病人体温逐渐升高, 并出现右侧聾骨及髀骨部疼痛(三叉神经痛), 在 2 h 内, 体温升高至 39°C , 在 2 h 后, 未经任何治疗, 体温逐渐下降, 很快恢复正常, 三叉神经痛也随之消失。起初以为是病情变化之故, 仍用西力欣治疗, 第二次用药后约 15min 左右, 又出现了上述同样的症状, 因是西力欣单独用药, 故考虑为西力欣的不良反应, 经停用西力欣, 改用 0.9% 氯化钠 500ml 加氨卡青霉素 5.0 g 及 5% 葡萄糖氯化钠 500ml + 苯唑青霉素 5.0 g, 静滴, 1 次/d, 连续用药 3 d, 再无上述症状出现, 5 d 后病人痊愈出院。