

山茱萸与混淆品山里红的鉴别

金素英* (浙江省台州药材站, 临海 317000)

山茱萸为常用中药。又名山萸肉、萸肉、枣皮、药枣, 始载于《神农本草经》。来源为山茱萸科植物山茱萸(*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.) 的

干燥成熟果肉, 有涩精、敛汗、补肝肾的功能, 可治腰膝酸痛、阳萎遗精、小便频数、月经过多、体虚多汗等症^[1]。以浙江临安、淳安产的质佳, 有杭萸

* 金素英, 女, 36岁。1979年毕业于浙江宁波商业学校中药班, 中药师。

肉、淳莢肉之称。金华医药站中药经营部最近发现安徽亳州药贩的莢肉样品实为蔷薇科植物山里红(*Crataegus Pinnatifida* Bge. Var. *major* N. E. Br.)的果实去核片,山里红(北山楂)具消积化滞、破气散瘀功能,用于肉食积滞、小儿乳

积、脘腹胀痛、痢疾、泄泻、痛经、产后瘀血腹痛、疝气、高血脂症等^[1],与山茱萸完全不同,因而不可混用。在药材真伪鉴别资料中,未发现山茱萸混淆品山里红的报道,因此,笔者将二者特征列表比较,以供药材收购、检验等部门参考。(见附表)。

致谢:浙江金华医药站质管科吕献康鉴定样品标本

附表 山茱萸与山里红特征对照

项 目	山 茱 萸	山 里 红
外 形	扁片状或囊状	片 块 状
果 皮	柔韧、果肉少	略韧,果肉多
色 泽	深红色至紫褐色	紫红色至棕褐色
刀 切 痕	无	有
表 面	无灰白色小斑点	有灰白色小斑点
果 核	长椭圆形长为0.9—1.3厘米	多为排列方式出现
气 味	味酸微苦涩	味酸微甜
所含糖类 ^[2]	葡 萄 糖	淀 粉
草 酸 钙 ^[3]	簇 晶	方晶、簇晶

参 考 文 献

- 1 中华人民共和国卫生部药典委员会,中华人民共和国药典(一部),北京:人民卫生出版社,1990. 19—20.
- 2 任仁安,陈瑞华等,中药鉴定学,上海:科学技术出版社,1991.382.
- 3 徐国钧等,中药粉末鉴定,北京:人民卫生出版社,1986.404.