

生肌拔毒膏制备及应用

许秀梅* 毕 菁 代公社

李焯华 杨 铁 刘汝成

(黑龙江省虎林县庆丰农场医院, 虎林 158410)

痈疖疮疡是外科的常见病, 术后切口易感染, 及各种皮肤感染等, 目前临床治疗方法多样, 我院于1992年配制了生肌拔毒膏, 经临床使用, 疗效满意, 现介绍如下:

1 处方

当归	10 g	川芎	10 g
白芷	10 g	没药	10 g
连翘	10 g	紫草	10 g
牡丹皮	10 g	酒大黄	5 g
煅石膏	15 g	铅丹	0.38 g
冰片	0.3 g	植物油	200 g
白凡士林	100 g		

2 制备 取当归、川芎、白芷、没药、连翘、牡丹皮、酒大黄、紫草(纱布包上)八味药装于能加热的容器中, 加入植物油加盖浸渍数10 min后加热至诸药变黑, 去渣取上清液过滤, 随即加入煅石膏(过

100目筛)趁热溶解, 将其加入盛有熔化好的白凡士林的容器中, 稍冷加入铅丹、冰片、搅拌均匀, 冷却即得。避光密封保存。

3 用法及疗效 先将患处消毒处理后涂上生肌拔毒膏, 用无菌纱布敷于上面, 胶布固定, 1次/d。经我院外科使用, 痈疖疮疡43例, 一般1~2 d见效, 3 d~2 wk全愈; 外科术后切口感染10例, 一般2~3 d见效, 10~20 d全愈。总有效率100%, 治愈率97%以上。

4 小结

本制剂工艺简单, 使用方便, 具有活血化瘀、清热凉血、消肿止痛、拔毒排脓去腐生肌之功效, 适用于痈疖疮疡, 大面积疮面久不收敛, 外科术后切口感染, 各种综合性皮肤感染, 深Ⅰ°—Ⅱ°烧伤, 促进肉芽组织生长, 给植皮打下基础。