

美欧卡霉素致腹泻2例

朱登凤 (江苏省泰州市人民医院, 泰州 225300)

美欧卡霉素(乙酰麦迪霉素)为新一代大环内酯抗生素, 非诱导耐药型。对各种感染, 尤以急性呼吸道感染有良好疗效。其不良反应有食欲不振、恶心、胃部不适等胃肠道反应, 暂时性的血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶值上升, 偶见皮疹、荨麻疹等过敏症状。现将我们遇到的美欧卡霉素致腹泻报道如下:

例1, 患儿, 男, 6 mo。因咳嗽2 d就诊, 无呕吐及腹泻。神志清楚, 精神可, 呼吸平稳, 咽部充血, 两肺呼吸音粗, 未闻及啰音, 心率108次/min, 腹平软。拟诊上呼吸道感染, 给予美欧卡霉素干糖浆半包, (每包0.5 g, 内含乙酰麦迪霉素0.1 g)冲服, tid, 非那更糖浆2 ml, po, tid, 次日患儿咳嗽加重, 同时出现腹泻, 鲜黄色稀水便5—6次, 不含粘液, 大便常规化验(-)。遂停用美欧卡霉素, 改青霉素40万u im, Bid, 加复合维生素B液2 ml, po, tid。次日腹泻停止, d3咳嗽减

轻, 停用青霉素, 继续服用美欧卡霉素, 次日又出现腹泻, 性质同上, 改用大力克后腹泻停止。

例2: 患儿, 男, 11 mo。因“支气管炎”住院治疗给予氨苄青霉素、先锋霉素V静滴等治疗1 wk, 咳嗽明显减轻, 体温正常, 肺部啰音消失后停静脉给药, 改美欧卡霉素1包冲服, tid, 当日下午出现腹泻, 大便常规检查(-)。家长反应, 1.5 mo前, 患儿曾因感冒予美欧卡霉素治疗, 出现类似症状。更换抗菌素后, 未再发生腹泻。

体会 本文2例在服用美欧卡霉素干糖浆后出现腹泻, 停药后腹泻停止, 再次用药后再次出现腹泻, 停药后腹泻亦再次停止, 笔者认为腹泻的出现与服用美欧卡霉素有关。因此, 临床应用美欧卡霉素时, 如出现腹泻, 应考虑可能是美欧卡霉素所致, 并应注意与腹泻病鉴别, 以免误诊。