

青霉素G钠致全身水肿1例

赵丽芳 刘珂 (浙江省诸暨市人民医院, 诸暨 311800)

患者,女,33岁。因咳嗽、发热,于93年4月27日就诊,诊断为上呼吸道感染。青霉素皮试(一),用青霉素G钠400万单位(石家庄第二制药厂,批号930331),加入10%GS 250 ml中Bid静滴2d, d3改qd, d4病人自觉头晕,脚重,乏力,下肢膝上发硬,复诊,体重、肝功能正常,血气分析正常,尿9A正常,心电图示:窦性心律,ST段轻度压低,电轴右偏,左右分支阻滞可疑,初步诊断心肌炎,再用青霉素G钠400万单位Bid静滴, d2全身水肿,下肢膝下手按有凹陷,无力行走,心肌酶谱

正常,再查尿9A正常, X光心肺无殊,停药,给双克1* Bid, d2水肿消退, d3恢复正常。

体会 青霉素G钠是一种细菌合成期的杀菌剂,临床上应用广泛,其不良反应主要为过敏反应,临床上已很重视,国内外有较多报道,本例用青霉素G钠后出现水肿,因未与其他药物伍用,体查无其他阳性体征出现,停药后进行对症治疗, d2水肿消退,考虑为青霉素G钠引起,应用青霉素G钠引起水肿在杂志少有报道,可能与个体差异有关。

收稿日期:1993—06—16