

安定致呼吸停止 1 例

黄鑫龙 罗德源 (广东省韶关市粤北人民医院, 韶关 512026)

患者女性, 48 a, 患者有青霉素过敏史。因地方性甲状腺肿在手术室拟静脉复合麻醉下行双侧甲状腺次全切除术, 术前常规开放二条静脉补液, 一管为 5% GNS, 另一管为 10% GS, 当用安定 (贵阳制药厂, 批号 920713) 10 mg iv 作麻醉诱导时, 3 min 后患者即出现呼吸停止, 嘴唇发绀, 心电图监测可见心电波, BP 10/7 kPa; 即给予人工呼吸, 面罩吸氧辅助呼吸, 10 min 后患者颈部、躯干部、肘部及两大腿内侧可见多量荨麻疹, 即给予地塞米松 10 mg iv 和苯海拉明 20 mg iv, 23 min 后患者恢复自主呼吸。后改用气管插管全麻下行双侧甲状腺

次全切除术, 术程顺利, 术后 5 d 拆线痊愈出院。

体会 患者有青霉素过敏史, 说明患者为过敏体质, 患者用安定前仅 iv 5% GNS 及 10% GS, 而术前用药 (鲁米那 100 mg im, 东莨菪碱 0.3 mg im) 是在患者呼吸停止前 70 min, 而 iv 安定 3 min 后, 即出现呼吸停止, 10 min 后全身出现荨麻疹, 而期间未用任何其他药物, 故考虑为安定所致的过敏反应。而从安定的剂量来看是属于治疗量, 同期的其他静脉复合麻患者, 均使用同一剂量, 同一批号, 并未出现此种不良反应, 这与个体差异有关。

收稿日期: 1993—07—08