

盐酸洁霉素致粘膜溃疡 1 例

姜大军 李新田 (河北省深泽县医院, 深泽 052560)

患者: 女, 45 a, 已婚。因阴道分泌物多而来院就诊。体检: 心、肺、腹部均未见异常, 一般情况良好。妇科检查: 外阴无红肿及皮疹, 阴道及宫颈稍有充血、无糜烂溃疡。宫体后位大小正常, 双侧附件(一), 诊断为: 细菌性阴道炎。给予盐酸洁霉素胶囊 1 粒(0.25 g), 取其内部药粉吹入阴道, 涂于宫颈, 隔日一次。用药后次日阴道分泌物增多, 呈水样。第二次用药后症状不减反而有些加重, 分泌物呈水样, 量多, 伴有外阴瘙痒发生。妇科检查: 外阴布满湿疹, 阴道及宫颈充血水肿, 宫颈下唇及后穹窿有多处边缘清楚的溃疡, 伴有血清样渗出物。考虑: 盐酸洁霉素过敏所致局部粘膜充血水肿、溃疡。随即停用盐酸洁霉素, 给予扑尔敏 4 mg/次、Bid、po, 局部用去炎松—尿素软膏。2 d 后用珍珠粉涂于溃疡处、隔日一次。用药两次, 分泌物明显减少, 外阴湿疹也逐渐消退, 于 1wk 溃疡消失全愈。

体会 盐酸洁霉素引起粘膜溃疡, 属于过敏反应第Ⅳ型(迟发型)变态反应。此反应中组织损伤系抗原与致敏淋巴细胞相互作用的结果^[1]。

迟发型变态反应发生后, 轻者随之停药后症状逐渐消退, 重者应用激素、抗组织胺类药物等治疗, 其疗程要适当延长, 症状缓解后逐渐减量。皮肤、粘膜受累出现过敏性皮炎、剥脱性皮炎、粘膜溃烂等应防止继发感染。选择适宜的去腐生肌收敛、脱敏的药物治疗。

随着盐酸洁霉素的广泛应用, 过敏反应也不断出现, 有的呈迟发型变态反应, 有的呈速发型变态反应, 因此用药时应询问用药过敏史, 尽量避免不良反应的发生。

参 考 文 献

- 1 王振铎等译.[美]A.戈尔茨坦等著.药物作用原理.北京:科学出版社出版, 1981.363~364.

收稿日期: 1993-08-05