

卡马西平致大疱性红斑 1 例

庄满利 (舟山市人民医院, 舟山 316004)

患儿: 女, 8 a。因癫痫而服用卡马西平, 100 mg/次, 3 次/d 口服, 服药 d 8 时腹部起红斑丘疹及数个小水泡疹, 轻微瘙痒, 家长未重视, 次日皮疹波及四肢, 面部, 躯干更甚, 水泡迅速融合增大增多, 易破。二眼睑肿胀, 口唇口腔粘膜糜烂疼痛张口困难, 外阴部红肿, 大阴唇内侧面与尿道口糜烂, 排尿时哭吵, 同时发热体温 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$, 当地医院用先锋霉素 V、激素治疗(剂量不详)2 d, 仍不能阻止病情发展, 除头皮外几乎全身皮肤累及, 皮疹成片、水泡遍身, 收住我科。

实验室检查: 血常规: 血色素 119 g/L, 白细胞 $9.3 \times 10^9/\text{L}$, 中性 0.66, 淋巴 0.30, 酸性 0.04, 血小板 $115 \times 10^9/\text{L}$, 大小便常规正常, 肝、肾功

能正常, 水泡泡液镜检白细胞 0—2/HP、培养阴性, 血培养无细菌生长。

处理: 停药卡马西平片, 全身应用先锋霉素 V, 新青霉素 I 抗炎, 地塞米松钙剂抗过敏, 同时补液维持水与电解质平衡, 眼、口腔、皮肤局部用药护理, 2 d 后体温正常, 全身水泡均破溃, 糜烂面结痂, 皮肤斑丘疹渐隐退, 并见有色素沉着, 部份先后脱皮, 剥脱面由红色转为黯红色, 眼睑红肿、结膜充血均逐渐消失口唇口腔粘膜糜烂渐趋愈合, 外阴红肿及尿道口肛周粘膜糜烂陆续好转, 住院 20 d 痊愈出院。

收稿日期: 1993—08—27