

复方苯乙哌啶致呼吸抑制 1 例

张冬雷 吴静珠 (江苏油田总医院, 江都 225261)

患儿: 女, 2.5 a, 因误服复方苯乙哌啶片 14 片后 6 h 入院, 病儿中上腹阵发性疼痛并呕吐三次, 入院查体: 面色苍白, 神志萎靡呈中度抑制状态, 瞳孔等大等圆对光反射灵敏, 心率 96 次/min, 律齐, 呼吸 13—14 次/min, 呼吸表浅, 呼吸音清, 口唇尚无紫绀。经过洗胃, 静脉给予超大剂量洛贝林 [39 mg 12 h 内], 病儿呼吸仍只有 14 次/min, 后给静脉推注纳络酮 0.2 mg, 很快病儿呼吸恢复正常,

6 h 后病儿痊愈出院。

体会 复方苯乙哌啶是度冷丁的衍生物, 有减少肠蠕动及收敛作用, 过量服用, (尤其在儿童) 可产生呼吸抑制, 曾有儿童服用 4 片而致死的报道。纳络酮是吗啡受体(阿片受体)阻断剂, 其化学结构与吗啡相似, 因而能与吗啡及度冷丁等产生竞争作用, 静脉给药可迅速解除呼吸抑制。

收稿日期: 1993—07—05