

晕海宁片致药疹 1 例

胡建淮 张益民 (解放军九八医院, 湖州 313000)

患者, 女, 47 a, 1993年6月7日, 外出上车前30 min 口服晕海宁片50 mg, 3 h后舌头及嘴唇有针刺、肿胀感, 随后嘴唇四周出现一圈红晕。10 h后, 会阴部外周皮肤搔痒, 未经治疗, 3 d后症状自然消失。同年7月12日, 患者又外出, 在上车前30 min 再次口服晕海宁片50 mg, 2 h后, 又出现同前次一样的症状, 并在手心、脚心、前胸处出现散在性红色丘疹, 每处都有7、8个红色丘疹, 形状不一, 奇痒, 抓后出现水疱。嘴唇红肿, 讲话困难, 症状比前次重。当日来医院治疗, 口服扑尔敏片, 4 mg, 3次/d; 维生素C片, 0.2 g, 3次

/d; 含酚炉甘石涂剂, 100 ml, 外涂。用药3 d后, 症状缓解, 丘疹搔痒难忍, 改用地塞米松片, 0.75mg, 3次/d, 用药2 d后症状基本消失, 搔痒控制, 只有脚心处的水疱到5 d后全部消失。

晕海宁是防治晕车、晕船的常用药, 临床应用中常有嗜睡、头晕、恶心、呕吐、上腹部不适等不良反应, 引起药物性皮炎少见。本例患者, 在服用晕海宁药前, 无服用过其它任何药物。两次服用晕海宁片后出现两次同样症状, 并有加重趋势, 认为患者系口服晕海宁片所致的药物性皮炎。

收稿日期93—10—12