

炎痛喜康致消化道出血 2 例

陈伦芳 雷绥民 (解放军第254医院急诊科, 天津 300142)

炎痛喜康为长效非甾体抗炎药, 具有镇痛、抗炎及解热作用, 作用机理与抑制前列腺素合成有关。其不良反应最常见为胃肠道反应, 亦能抑制血小板聚集延长出血时间, 引起消化性溃疡的胃肠道出血。我科有两例因服炎痛喜康而致消化道出血, 报告如下:

例1, 男性, 55 a, 于90年1月中旬因肩周炎服炎痛喜康20 mg/d。于2月2日出现上腹烧灼感, 并排柏油样便300 g, 呕血200 ml (黑红色), 感头

晕, 乏力。化验大便潜血卅, 血色素9.8g%。胃镜见: 胃底粘液湖内有大量新鲜积血, 胃粘膜表浅糜烂、渗血。喷洒10%孟氏液20 ml。入院后输血400 ml, 并用抗酸、止血药物治疗治愈出院。

例2、女性, 52 a。因右肩疼痛, 服炎痛喜康, 20 mg/次, 2次/d。d 7晨突然大口呕血, 约100 ml。胃镜见: 胃粘膜散有米粒大小多个溃疡面, 轻度渗血。经抗酸, 止血治疗治愈出院。

收稿日期:1993—10—22