

咳快好治疗无痰干咳106例观察

孙 焯 (杭仪集团公司医务室, 杭州 310006)

1 对象

本公司职工及家属, 年龄限在 6~60 a, 男 37 例, 女 69 例, 以伤风感冒后引起的急性上呼吸道感染病例为主, 主要症状表现为: 无痰的或痰液很少的剧烈咳嗽。而老年性慢性支气管炎, 肺结核, 支气管扩张伴感染等呼吸道疾患引起的咳嗽, 痰液分泌量多的咳嗽病例不在用药范围。

2 药品来源

用锦州制药一厂生产的镇咳药咳快好糖衣片剂。

3 治疗方法

治疗组: 咳快好片, 40mg 一日三次, 一般用药 2 d, 小儿按患儿岁数酌减。

对照组: 用头孢氨苄 0.375 g 一日三次口服,

若无效即改用林可霉素 0.6 g 一日二次肌肉注射, 或者青霉素 80 万 U 一日二次肌肉注射, 用药 5~10 d, 同时用止咳糖浆。

4 结果

1 治疗组: 92 例无痰或少痰干咳患者, 阵咳次数在每日 10 次至 15 次的病例, 81 例止咳时间在 2.63 ± 1.01 d ($P < 0.01$), 11 例效差; 9 例阵咳次数每日在 15 次以上者止咳时间为: 1.82 ± 0.42 d ($P < 0.01$), 全部有效; 5 例咳嗽次数一日内基本不间断病例止咳时间为 0.92 ± 0.32 d ($P < 0.01$), 全部有效。总共 106 例干咳患者 95 例有效, 11 例效差, 治愈率达 90%, 效益只占 10%。

2 对照组: 38 例阵咳次数每日内在 10—15 次病例, 31

(下接第 15 页)

(上接第57页)

例止咳时间 6.01 ± 1.23 d ($P < 0.01$), 7例效差, 17例咳嗽次数每日内在15次以上者, 11例效果差, 有效6例, 且止咳时间在 7.03 ± 1.61 d, ($P < 0.01$), 1例咳嗽基本不间断患者用药10 d效果不好而改用咳快好治疗。共56例病例, 有效37例, 治愈率66%, 无效19例, 占34%。

5 讨论

在用该药治疗咳嗽的过程中, 需要注意的是,

因为咳快好是一种直接抑制咳嗽中枢的镇咳药, 且镇咳作用较可待因强2—4倍^[4]。老年、婴幼儿以及痰液分泌量多的患者禁用或慎用, 这些患者的咳嗽中枢一旦受抑制, 咳嗽反射消失, 痰液瘀积在气管和支气管中不能咳出, 使感染越来越严重, 甚至可因此窒息而危及生命, 故仅限用于无痰干咳或痰少剧咳患者。

收稿日期: 1994-04-11