

口服诺氟沙星胶囊致剧烈腹痛一例

张秀珍 周超平(浙江省丽水地区医院, 丽水 323000)

患者, 女, 22 a, 本院五官科医生, 因尿路感染, 于当天晚饭前一次性口服诺氟沙星胶囊4片, 服用后2 h左右突感剑突下剧烈绞痛, 呈阵发性加剧, 伴恶心、全身出汗。体检: 腹部柔软, 剑突下明显压痛, 胃型明显。肌注阿托品0.5 mg + Uk 38 mg, 腹痛无明显缓解, 之后感觉胃内有振水音, 约4 h许呕吐出药物及胃内容物后, 腹痛立即减轻, 约10 min后腹痛完全缓解。

追问病史, 患者原无胃病史, 近日无胃肠道不

适症状, 当晚否认进食不洁饮食及其它用药史, 也无肠鸣音亢进及腹泻现象。经回忆二年前在工校时曾先后二次服用诺氟沙星胶囊, 均有急性腹痛发作现象, 但没有此次严重, 考虑与服用剂量多少有关(前二次剂量为2*/次, 此次剂量为4*/次), 属于胃肠道不良反应, 还是胃肠道过敏症状, 目前难以确定, 尚有待进一步探讨。

收稿日期: 1993-04-30