

他莫昔芬致麻疹样红斑 1 例

辛学俊 (浙江省黄岩市第一人民医院, 黄岩 317400)

他莫昔芬(三苯氧胺, Tamoxifen)为治疗乳腺癌、子宫肌瘤新药, 现有资料查阅未见有致麻疹样红斑报告^{[1][2][3]}。我院近遇口服他莫昔芬致麻疹样红斑一例, 现报告如下。

患者, 女, 38 a, 经各级医院确诊为子宫肌瘤后, 于93年8月16日再入本院, 拟行手术治疗, 住院号18260。8月16日中午自行首次服用他莫昔芬一片(芬兰产), 下午行青霉素皮试(一), 血常规检查等术前准备, 下午6时再服他莫昔芬一片, 晚上即出现全身麻疹块。8月17日上午停服他莫昔芬, 给

予10%葡萄糖酸钙针和50%葡萄糖针静脉注射后, 症状稍退, 下午给青霉素G钠, 丁胺卡那针, 葡萄糖输液等常规用药, 晚上全身麻疹块复发加重。8月18日继续给予10%葡萄糖酸钙和50%葡萄糖针静脉注射, 虽作8月19日上午手术的一切准备工作。8月19日术前检查全身广泛性麻疹样红斑, 手抓痒处大片皮下青紫淤斑, 给予赛庚啶口服, 维厂胶性钙针, 西咪替丁针, 葡萄糖酸钙针, 地塞米松针, 维生素C针等抗过敏治疗持续至8月23日, 疹块消退痊愈。

收稿日期: 1993-09-28