

复方新诺明引起过敏性休克 1 例

周万新 (北京康庄287医院, 康庄 102101)

患者陆××, 男, 46 a, 因患牙龈炎于94年1月13日晚8点口服复方新诺明2片, (保定古城制药厂, 批号911015)服后约10分钟, 自觉尿道灼, 痒, 继之阴囊、双手及全身皮肤搔痒, 双耳有堵塞感, 双手有针刺感, 胸闷、呼吸困难、心慌、恶心、全身无力、视物模糊等症状。(途中呕吐2次)检查: 病人神志清醒, 面潮红, 双眼巩膜严重充血, 全身弥漫性荨麻疹, 心率120次/分, 脉弱, 血压10.7/6.7 kPa, 立即给肾上腺素1 mg 肌注, 10%葡萄糖

50 ml 加10%葡萄糖酸钙10 ml 静注, 口服强的松10 mg, V_c 0.2g, 扑尔敏8 mg, 15分钟后病人血压恢复至14.7/10.7 kPa, 心率90次/分, 呼吸困难、胸闷等自觉症状消失, 面潮红及巩膜充血症状减轻, 但视物仍模糊。14日继续服药, 15日全身荨麻疹消失, 视物模糊症状减轻。

患者自述平素健康, 只对敌敌畏过敏, 过去也曾多次服用过此药, 未曾发生过过敏症状。

收稿日期: 1994-03-12