

西比灵致顽固性呃逆 1 例

崔宝菊 (济宁市第一人民医院药剂科, 济宁 272100)

患儿, 男, 17 a, 误服西比灵(西安杨森制药有限公司, 批号 920802) 2 片 (5 mg/粒), 2 h 后频繁非喷射性呕吐食物残渣, 7—10 次/min 而入院。体检: 精神萎靡, 轻度脱水貌, 面色苍白, 口唇发绀, 光反应灵敏, 颈软, 双肺呼吸音粗, 肝脾未及, 急灌入硫酸镁促进排泄, 静滴 10% 葡萄糖、维生素 C、ATP 等保护肝脏, 维生素 B₆、爱茂尔止吐, 先锋霉素 V 防止感染等一系列治疗, 7 d 痊愈出院,

随访一般情况好。

讨论: 西比灵为一选择性 Ca²⁺ 拮抗剂, 可阻滞各种病因刺激下过量的 Ca²⁺ 跨膜进入细膜造成损伤或坏死, 主用于偏头痛等的治疗, 治疗剂量下有时出现嗜睡和疲惫, 胃肠道反应未见报道, 而此例笔者认为原因是误服, 量偏大, 考虑是西比灵由胃肠道吸收后与血浆蛋白结合沉淀变性而致的急性胃肠道反应。

收稿日期: 1994-04-06