

氟桂利嗪致阳萎 1 例

孟凡振 刘 杰 (山东省单县中心医院, 单县 273700)

氟桂利嗪(flunarizine, FLU, 西比灵)为一选择性钙通道阻滞剂, 主要用于偏头痛, 缺血性脑血管疾病及癫痫等。一般不良反应为嗜睡、乏力、罕见锥体外系反应。FLU 引起阳萎的病例, 笔者未见文献报道, 现报道 1 例。

男性, 29 a, 以偏头痛 8 mo, 曾服用赛庚啶, Vit、K₄ 等药物疗效欠佳, 最近 1 wk 偏头痛加重, 于 1993 年 5 月 12 日就诊, 门诊给予 FLU, 10 mg、qd、PO (西安杨森制药有限公司生产, 批号

911129011), 连取 6 d 后, 头痛症状明显减轻, 但患者阴茎不能勃起, 无性功能状态(患者服药前性功能正常), 于 d 8 停用本品。10 d 后性功能逐渐恢复, 25 d 性功能恢复正常。1 mo 后患者偏头痛发作, 再次服用 FLU, 10 mg、qd、d₅ 上述症状重现, 考虑与 FLU 有关, 停用本品, 并给于补肾壮阳中药治疗, 1 mo 后性功能方恢复正常, 随访至今未见复发。

收稿日期: 1994-04-21