

薄醋氟洗剂的配制及临床应用

谢恒义 蓝开平 (浙江建德市第三人民医院, 建德 311612)

薄醋氟洗剂为我院皮肤科外用制剂, 经二年多临床使用和观察证明对皮炎疗效明显, 使用方便, 深受病人欢迎。现将配方及临床疗效观察报道如下:

1 薄醋氟洗剂的配制

1.1 处方: 薄荷脑20 g; 醋酸铝溶液^[1]50 ml; 醋酸氟美松0.25 g; 95%乙醇600 ml; 蒸馏水加至1000 ml。

1.2 制法: 将薄荷脑、醋酸氟美松溶于乙醇中^[2], 必要时进行过滤, 加醋酸铝溶液, 最后添加蒸馏水至1000 ml, 搅匀即得。

1.3 质量标准: 参照中国医院制剂规范薄荷脑醋酸铝洗剂项下要求。

2 用法 涂抹皮炎局部, 每日3—4次。

3 临床疗效观察

观察对象: 常见门诊皮肤科各类皮炎患者84例, 男性56例, 女性28例。

观察方法: 按上述方法局部用药后, 每二天观察一次, 共4次, 半个月再随访一次。

观察标准: 皮炎局部搔痒消失, 炎症, 红斑, 丘疹, 皮肤损害消退。用药后2 d内上述皮肤症状消失为显效; 4 d内消失为有效; 6 d内消失为较有效; 1 wk以上未消失为无效。

4 结果

各种皮炎涂抹本洗剂后, 皮肤搔痒难受症状迅速得到控制, 炎症, 红斑, 丘疹等皮肤损害不同程度消退。对夏季性皮炎, 过敏性皮炎, 有效率达100%。疗效观察见表。

5 小结

薄醋氟洗剂是在薄荷脑醋酸铝洗剂^[1]的组方基

薄醋氟洗剂治疗各类皮炎疗效观察表

皮炎种类	例数	显效	有效	较有效	无效	有效率 (%)
夏季性皮炎	48	41	7	0	0	100
过敏性皮炎	23	12	10	1	0	100
脂溢性皮炎	5	0	1	1	3	40
神经性皮炎	8	0	0	2	6	25

础上加入氟美松配制而成。氟美松为高效糖皮质激素类药, 具有消炎、抗过敏, 抑制免疫反应, 减轻机体对各种刺激性损伤引起的病理反应的作用, 从而提高了本洗剂的消炎, 收敛止痒效果。薄醋氟洗剂对各类皮炎具有疗效, 尤其对夏季性皮炎, 过敏性皮炎疗效显著, 可作为皮肤科常用制剂。但应注意, 长期应用高效皮质激素制剂, 局部可发生皮肤萎缩纹, 毛细血管扩张, 红斑及继发感染等副作用^[3]。本文治疗病例, 一般用药时间为3—6 d, 最长用药未超过10 d, 尚未见不良反应。从附表中可以看出, 薄醋氟洗剂对脂溢性皮炎, 神经性皮炎有一定疗效, 但不宜长期应用, 以免产生副作用。

参 考 文 献

- 1 卫生部药政局编. 中国医院制剂规范. 天津: 天津科技翻译出版公司出版, 1989, 39:106
- 2 南京药学院主编. 药物化学. 北京: 人民卫生出版社出版, 1978, 637.
- 3 郭奕瑛. 皮肤科外用药物与临床应用的几个问题. 中国医院药学杂志. 1984, 2—25

收稿日期: 1994-05-11