

# 复方新诺明引起过敏反应 2 例

尚彦城 王 野 付淑艳 王丽荣 阎 江 周连举

(齐齐哈尔医学院第一附属医院, 齐齐哈尔 161061)

例 1, 男性, 38 a。自诉龟头处有奇痒、灼痛感。查体见龟头处有数个小米粒大小圆形红斑, 有一处有糜烂与渗出。近日用药史。昨曾有性接触史及其妻正在服用复方新诺明, 取其妻阴道分泌物在患者上臂内侧用划痕法试敏, 划痕周围出现斑丘疹。故诊断为磺胺类药物间接过敏所致固定型药疹。给予息斯敏治疗, 三日后复诊时药疹消失。

例 2, 男性, 39 a。自诉近两日面部、颈部及上半身先后出现瘙痒、皮肤潮红症状。查体见面部、颈部、前胸、后背等处皮肤均呈淡红色水肿与风团。本人虽有磺胺药物过敏史, 但否认近日有用药史及与有过敏性质物质的接触史。以过敏性荨麻疹入院治疗。经口服息斯敏及静滴地塞米松, 7 d 后痊愈出院。第二天复发再次来院就诊, 问诊得知出院后与妻有性接触史, 其妻服用复方新诺明已两周, 上次住院期间否认与其妻有性接触及过去性接触也无类似现象。取其妻阴道分泌物于患者上臂内侧皮肤

处用划痕法试敏, 划痕周围出现红斑丘疹。诊断为复方新诺明间接药物过敏反应。

## 讨 论

复方新诺明为磺胺甲基异恶唑与甲氧苄胺嘧啶所组成。在阴道中各类磺胺药物均有吸收, 其中甲氧苄胺嘧啶在阴道液(pH 为 4.0~4.5)中的药物浓度为其血中药物浓度的三倍。本文二例对磺胺药物均有过敏史及夫妻生活多年的事实, 只是在妻子服用复方新诺明之后性接触才出现过敏, 其原因可能是由于阴茎粘膜及可能出现的阴茎粘膜轻微损伤而将妻子阴道分泌物中的磺胺药物摄入体内而引起自身的药物过敏反应。由此提醒临床医生使用复方新诺明药物时, 既要注意到患者自身的药物过敏史, 也应注意注意到患者配偶的药物过敏史, 以免引起不必要的间接药物过敏反应发生。

收稿日期: 1994-01-30