

## 18-氨基酸静脉滴注引起过敏性休克 1例

李炳贵 张金星 李 霞 (新疆奎屯州医院, 奎屯州 833200)

患者女, 35 a, 于不全梗阻于94年7月29日住进我院普外科, 当日行剖腹探查, 发现降结肠肿瘤, 将左半结肠切除。术后抗炎补液常规支持治疗。30日起用18-氨基酸(广州侨光制药厂批号93100622)每日250 ml, 按说明书30—60滴/min静脉滴注, d5当输到1/3瓶时, 病人突然感到胸闷、心悸, 面色青紫, 口唇及四肢发绀等缺氧现象, 数秒钟后, 心跳无力, 呼吸停止、脉搏触无, 血压为0。立即停输18-氨基酸, 行人工呼吸, 吸氧, 静脉注射肾上腺素, 地塞米松利多卡因, 同时静滴50%葡萄糖大剂

量V-C, 10min后, 呼吸、精神、神志好转, 慢慢恢复正常。由于急救药品准备齐全、抢救及时, 使病人很快转危为安。

### 讨论:

18-氨基酸是人体所必需的营养物质, 对慢性病、高烧、手术等, 可以有效地补充氨基酸, 一次200 ml—500 ml, 每天一至数次, 滴速过快偶可引起恶心、呕吐、发热头痛, 应引起临床医生重视。

收稿日期: 1994-09-01