

苯丙醇胺引起急性荨麻疹 1 例

肖科武 杨友根 (湖南省益阳地区人民医院, 益阳 413000)

患者, 女, 30 a, 1993年10月, 因感冒头痛、流鼻涕, 自服康泰克1*, 批号9211710, 服药1 h后, 自感周身皮肤发热、瘙痒, 手摸即出现团状丘疹, 在此前未服任何其它药物, 立即来我院急诊科就诊。患者自述曾因其它原因服用过扑尔敏, 未见不良反应。体检, $T 38.5^{\circ}\text{C}$ 。四肢及全身团状丘疹, 其它未见异常, 诊断为康泰克致急性荨麻疹, 当即推注50%葡萄糖20 ml加地塞米松5 mg, 3 h后丘疹消失。1994年5月又因患感冒, 自服帕尔克1*,

批号930403, 1 h后症状同前, 当即按前一次处理, 症状消失。

讨论: 患者先后分别服用康泰克、帕尔克致敏值得注意如下两点: ①两种感冒药均含有苯丙醇胺和扑尔敏, 患者曾服用过扑尔敏无过敏史, 因此苯丙醇胺可致敏应引起重视。②目前临床各种新复方制剂不断出现, 在使用新药时一定要了解其处方组成及性能, 以防发生不良反应。

收稿日期: 1994-08-25