

氨糖美辛引起血压升高1例

李 文 邱永年 (厦门市第一医院, 厦门 361003)

患者女性, 60 a, 既往无高血压史和心脏病史, 平时血压未超过 16/10.7 kPa。因膝关节炎于 1994 年 1 月 20 日开始口服氨糖美辛(英文名: Compound Glucosamine, 浙江普陀山制药厂, 批号: 931106) 1 片, bid, 同时服用硫糖铝 1.0 g, tid, 以减少可能产生的胃肠道反应。服用 7 d 后, 患者感觉头晕、行走飘浮不稳、恶心。检查: 体温 36.8 °C, 心率 75 次/min, 血压 18/12.7 kPa。即停上述药, 服用降压药复方罗布麻 1 片, tid, 共 2 d, 血压即下降至正常 16/10.7 kPa, 症状消失。再次服用氨糖美辛 1 片, bid, 同服复合维生素 B1 片,

tid, 停用硫糖铝。5 d 后又出现头晕、行走飘浮不稳、恶心等相同症状。检查: 血压 18/13 kPa。停药, 再服复方罗布麻 1 片, tid, 共 2 d, 血压即恢复正常 16/10.7 kPa, 症状消失。停用氨糖美辛后, 血压监测一直正常。

老年高血压多属慢性、进行性疾病, 需长期治疗, 该患者既往无高血压史和心脏病史, 两次服用氨糖美辛后血压升高, 降压处理后迅速恢复正常, 以后血压监测一直正常。可以确认该患者血压升高系氨糖美辛所致。

收稿日期: 1994-09-26