

链鱼油滴鼻引起过敏性休克1例

钱欣梅 (山东省济宁市第一人民医院, 济宁 272111)

张向阳 (山东济宁医学院, 济宁 272113)

患者, 男性, 12 a。因慢性鼻炎、鼻中隔前下部粘膜糜烂用本院配制的链鱼油液滴鼻数滴, 约 2 min 后自觉胸闷, 气促, 口唇麻木、发胀, 眩晕, 双上肢不规律抽动。查体: 体温 36°C , 脉搏120次/min, 呼吸30次/min, 血压 $8/4\text{ kPa}$ 。面色苍白、多汗, 四肢发凉, 烦躁不安, 神志清晰。全身可见散在的荨麻疹, 以面颈部为多。双肺呼吸音清晰。心律规整, 心音稍钝, 各瓣膜区未闻及杂音。腹软, 肝、脾未触及。临床诊断: 链霉素过敏性休克。立即给予氧气吸入, 皮下注射1:1000肾上腺素1 ml。

非那根50 mg, 氟美松5 mg 肌肉注射后5 min 症状逐渐缓解。翌日症状消失, 皮疹消退, 血压恢复正常。

讨论: 链鱼油为链霉素及鱼肝油的复合制剂。对萎缩性鼻炎、干燥性鼻炎效果较好。该例追问病史曾有因肌注链霉素发生过敏性休克史。链霉素引起的过敏性休克较少见, 但死亡率较高, 所以临床上应用链鱼油时应注意询问是否有链霉素过敏史。