

头孢拉定静脉注射引起肉眼血尿 2 例

叶朝阳

(上海长征医院肾内科,

上海

200003)

例 1, 患者, 男, 30 a, 因肉眼血尿 1 d 入院。病人因低热咳嗽 2 d, 静脉注射生理盐水 20 ml + 头孢拉定 4.5 g, 注射毕即感腰部酸胀, 2 h 后腰部酸胀加重, 出现全程肉眼血尿 2 次。查体: T 36.8, BP 16/10, 面部无浮肿, 皮肤粘膜无出血点或瘀斑, 心肺(-), 腹软无压痛, 肝脾(-), 双肾区叩痛; 化验: Hb 147 g/L, WBC $5.3 \times 10^9/L$, N 0.8, L 0.2, BUN 4.8 mmol/L, Scr $76 \mu\text{mol/L}$, 肝功能正常, 尿常规: 蛋白(±), 红细胞满视野, 均一型, 腹平片(-), B 超双肾输尿管(-)。入院后给予输液, 氢化考的松静滴, 尿色转清, 次日尿常规(-), 后连续 4 天尿常规正常出院, 随访一年无异常。

例 2, 女, 18 a, 因肉眼血尿 5 h 入院。病人因咽痛咳嗽 3 d, 用生理盐水 20 ml + 头孢拉定 2 g

静注, 每日 2 次, 连续两天未见尿液异常, 第 3 日静注头孢拉定 6 g + 生理盐水 20 ml, 注射毕感全身灼热, 头昏, 出冷汗, 片刻缓解, 5 h 后出现全程肉眼血尿一次, 伴右肾区隐胀痛。查体: T 36.8, Bp 16/11, 面部无浮肿, 皮肤粘膜无出血点, 瘀斑或黄染。心肺(-), 右腰部轻压痛, 双肾区轻叩痛; 化验: Hb 123 g/L, WBC $5.5 \times 10^9/L$, N 0.8, L 0.2, BUN 6.5 mmol/L, Scr 80 mmol/L, 肝功正常; 尿常规: 蛋白(±), 红细胞满视野, 均一型。B 超双肾输尿管及附件无异常发现。入院后经输液尿色渐清, 次日尿常规: 蛋白(-), 红细胞 3—5 个/HP, 2 天后多次尿常规正常, 症状消失出院, 随访至今无异常。

收稿日期: 1993-11-01