

青霉素引起胃出血 1 例

魏静丽 马 燕 (山东省济宁市精神病防治院, 济宁 272151)

青霉素钠为临床常用抗生素, 过敏常见, 但引起胃出血者未见报道, 现将所遇 1 例报道如下:

患者女, 46 a, 因“牙周脓肿”住院治疗, 平素无食物及药物过敏现象, 并多次应用青霉素均无过敏反应, 这次应用青霉素钠(鲁抗 B 930409)做皮试(-), 肌注 80 万 u 后, 再静滴 5% GNS 300 ml + 青霉素 800 万 u, 滴速为 80 滴/min, 约 20 min 后, 病人感皮肤发痒, 面部赤红, 立即停静滴药物, 给予氟美松 5 mg 静脉推注, 血压 18/10 kPa, 体温 37.4°C,

心率 100 次/min, 这时患者感头重脚轻, 眼冒金花, 腹部刀割样疼痛, 在床上翻来复去, 同时恶心, 呕吐, 呕吐物为咖啡色及新鲜血块约 100 ml, 无呼吸困难现象, 立即肌注非那根 50 mg, 肾上腺素 1 mg, 静滴 10% GS 500 ml + 6-氨基乙酸 8 g, 20 min 后患者出汗, 面色由红转黄, 腹痛逐渐减轻, 整个过程持续约 1 h, 第二天恢复正常。

收稿日期: 1993-12-28