

复方解热镇痛药引起不良反应 2 例

方秋珍 (浙江省中医院, 杭州 310006)

例 1, 男性、38 a, 因感冒、头痛、服自备药 A、P、C 1 粒, 头孢氨苄 2 粒。次晨觉浑身乏力, 皮肤瘙痒、烧灼感, 前来我院就医。

查体: 面部、颈、前胸有皮疹, 色红, 压之退色, 口唇有小疱。治以强的松, $Ticl$, 10 mg/次, 4 月 4 日复诊。查体: 见其皮疹不能控制, 反而扩散到躯干, 四肢, $T 38.5^{\circ}C$ 。即用大剂量激素: 氢考松, Vitc 等静滴治疗。至当日后半夜, 小疱连接成大疱。查体: $T 39.5^{\circ}C$, 大疱遍布全身, 上至发际处。下至足底。推之, 内部液体移动, 皮破损处流黄水。眼睑、鼻粘膜、口腔、食管内粘膜, 尿道口粘膜均溃疡。少尿 $\rightarrow$ 无尿。

会诊结果: 由 A、P、C 片中毒引起大疱、表皮松懈、萎缩、坏死型皮炎。经用: 复方氨基酸;

脂肪乳剂支持疗法; 悉复欢(环丙沙星) Bid, 0.2 g/次静滴抗炎; 大剂量激素: 氢考松 300 mg, 地塞米松 40 mg 抗过敏。

1 mo 后开始脱皮, 到 5 月 15 日治愈出院。

例 2, 男性、47 a, 三天前因头痛、发热($T 38.5^{\circ}C$), 服自备药索密痛 1 粒, 螺旋霉素 2 粒。查体: $T 29.5^{\circ}C$ 面、前胸小疱透亮, 口唇、眼睑皆溃疡……, 体征与上述病例一样。诊断, 由索密痛片中毒引起大疱, 表皮松懈, 萎缩, 坏死型皮炎。采用法同治疗。于 7 月 15 日治愈出院。

以上 2 名患者均以过敏性皮炎、发热开始, 继之发现少尿、无尿、渐形成大疱。笔者认为非那西汀的代谢产物——醋氨酚引起。患者应属药物性特异体质。