

氟哌酸注射液引起高热过敏反应 1 例

胡 平 (南京军区总医院药品科, 南京210002)

氟哌酸为喹诺酮类抗菌药物。因喹诺酮类和其他抗菌药物的作用点不同, 它们以细菌的 DNA 为靶, 对细菌显示选择性毒性。因此, 当前这类药物在抗生素中发展较快, 应用较广, 深受临床欢迎。这类药物具有广谱、高效、低毒的特点, 临床上应用普遍, 但在应用过程中出现了一些不良反应。本文报告氟哌酸注射液静脉滴注引起全身高热过敏反应一例如下:

患者, 男、24 a、体重 60 kg, 因发热畏寒半天入院。体温 38.8°C , 心率118次/min, Bp 17/11 kPa, 诊断为上呼吸道感染。用药剂量为: 氟哌酸注射液0.4 g, 2 / 日, 静滴, 5 %葡萄糖注射液500

ml, 维生素C注射液 2 g, 维生素 B₆注射液0.2 g, 静滴。输液过程中, 患者感畏寒, 上腹不适, 患者自述无药物过敏史。停药后体温逐渐下降至 38°C , 不适症状消失。第二日再次接受同样药物, 症状重复出现。停药氟哌酸注射液, 改用其它抗生素, 无类似症状发生。因此, 诊断为氟哌酸注射液过敏。

目前, 由于氟哌酸注射液具有优良的抗菌作用, 而被广泛应用于临床, 有报道说氟哌酸注射液有局部的不良反应, 但是在治疗剂量内全身过敏反应少见, 因此, 应引起临床医生的重视。

收稿日期: 1995—04—28