

福蓓素引起药疹 1 例

杨 捷 (浙江省绍兴市第五医院, 绍兴312000)

王莉莉 (浙江省绍兴市妇幼保健院, 绍兴312000)

患者女性, 32 a。1994年3月因长期纳差来我院购福蓓素 100 ml/瓶, d 3 因瘙痒, 皮肤出现细小红色皮疹就诊。查体: T 37.5°C, 咽轻度充血, 双侧扁桃腺不肿大, 心肺阴性, 腹软, 肠鸣音正常, 神志清醒。全身呈蜜集红色丘疹, 尤以上肢为显著, 伴中度瘙痒。疑为乙醇或维生素 B 族过敏, 但患者称, 曾长期服用市售三倍浓复合维生素 B 溶液并未引起过敏。因无法确定过敏原因, 医嘱给予扑尔敏 4 mg tid × 3d, 并嘱停用福蓓素观察, 3 d 后皮疹消退。1994年12月5日, 患者再次从我院购福蓓素 100 ml/瓶, 服用 1 d 后, 再次出现全身性

散在红色丘疹, 遂即停药, 息斯敏 10 mg qd × 2d, 皮疹全消。故确认为福蓓素过敏。

讨论: 福蓓素系复合维生素 B 液制剂, 由杭州民生优力赛制药公司生产, 每瓶 100 ml 精装, 主药成分为 VitB₁、VitB₂、VitB₆、烟酰胺, 与市售桶装复合维生素 B 液相同。但因辅料和添加剂不详, 无法与复合维生素 B 液比较。笔者推测, 福蓓素中辅料和添加剂与复合维生素 B 液有所不同, 过敏原因系福蓓素中的辅料或添加所引起。