

强力安喘通引起晕厥 1 例

王雪娟 李 波 (内蒙古呼盟医院, 呼盟, 021008)

患者男性、33 a。因支气管哮喘入院。来院查体: 双肺满布哮鸣音, 心率120次/分。化验检查血糖、血色素均正常。心电图, 窦性心动过速。入院后给地塞米松 10 mg, 氨茶碱0.25加糖中静点。二日后症状缓解, 心率下降至90次/分, 律齐, 但因常在夜间哮喘发作故加用强力安喘通口服, 用量为每日二次, 每次二粒。患者在首次服药后半小时左右在坐位时突然跌倒, 意识丧失。因持续时间较短故未引起注意, 当日晚再次服药, 服药后约一小时在起身时突然跌至床下, 头部轻度擦伤, 意识丧失时间较前一次长, 约数分钟后恢复。当时测血压、心率均

正常; 采指血做微量血糖测定亦正常。故考虑为服用强力安喘通所致, 嘱患者停药, 停药后未再发作。

讨论: 该患者既往无晕厥病史, 二次发作均在服药后, 停药后症状消失。故可证实为强力安喘通所致。强力安喘通是复方合剂, 主要成份是盐酸甲氧斐那明、若斯卡平、氨基菲林、苹果酸氯苯拉明。其中氨基菲林不但有扩张支气管平滑肌的作用, 而且有扩血管作用。故可造成体位性低血压; 而苹果酸氯苯拉明属抗组织胺类药物, 此类药物也有头晕、晕厥的付作用。

收稿日期: 1995—03—23