

消炎利胆片引起固定性药疹 1 例

梁斌元 (浙江省新昌县人民医院, 新昌 312500)

固定性药疹为药疹中最常见的一种类型。致敏药物主要为磺胺类、解热镇痛剂及巴比妥类药物, 而消炎利胆片引起固定性药疹者却少见报道, 现将本科发现的一例报告如下:

女性患者, 59 a。因胆囊炎、胆石症口服消炎利胆片[由浙江省温州人民制药厂生产, 批准文号: 浙卫药准字(1993)0460—1], 每次 5 片, 1 日 3 次。服药约 2 h 后即见左腕背出现皮疹伴瘙痒 而于 当天 (1994 年 10 月 16 日) 下午来本科求诊。体检: 左腕背

可见米粒~黄豆大丘疹及水疱, 丘疹及水疱周围尚有暗红色斑疹, 皮疹边缘不规则。追询病史, 患者于近半年来在同一部位已发生类似皮疹 3 次。且都在口服消炎利胆片后发生。平素不戴手表, 发病前亦无局部用药史, 固定性药疹的诊断可以确定。

处理经过: 嘱立即停用此药, 并经抗敏及对症治疗恢复正常, 随访半年未见复发。

体会: 固定性药疹为药疹中较常见的类型, 常由磺胺制剂、解热镇痛剂及巴比妥类药物引起。一

般认为固定性药疹发疹以皮肤和粘膜交界处最多见。而本例既往虽有多次发作,但由于消炎利胆片不是引起固定性药疹的常见药物,发疹部位又非该型药疹的常见部位,故未予重视。因而,笔者认为,

凡遇到同一部位反复发作的皮疹,伴明显瘙痒者,均应详细询问用药史,以防药疹。

收稿日期:1995—08—23