

静滴得希注射液引起过敏性休克1例

窦武宇 (甘肃省华亭矿务局医院, 安口 744103)

得希注射液(硫酸西梭霉素)是近年来临床上广泛使用的新一代氨基糖甙类抗生素,其疗效高,毒性低,得希注射液的过敏反应主要是皮疹、静脉炎等,但是我们在该注射液的使用过程中出现1例静滴得希注射液引起过敏性休克,现报道如下:

患者:女14 a,持续发烧5 d, $T 38.5^{\circ}\text{C}$,咳嗽,拟诊为“上呼吸道感染”给予得希注射液(天晴制药原江苏连云港东风制药总厂,生产批号9410151)100 g,加入0.9% NaCl 250 ml中静脉点滴,药物输入后的0.5 h,患者出现头晕、胸闷、呕吐、心悸、口角抽搐、呼吸困难、神志不清等症状,查体:血压测不到,心率124次/min,全身皮肤潮红、口唇红肿,诊断为过敏性休克,即刻吸氧,给予肾上腺

素1 mg、氟美松5 mg静脉注射,之后给予多巴胺40 mg,间羟胺20 mg加入5%葡萄糖盐水250 ml中静滴,经1 h抢救、呼吸渐平稳、血压上升至13/8 kPa,患者神志转清,颜面潮红消失,住院72后康复出院。

讨论:本例全身皮肤潮红、口唇红肿、瘙痒及胃肠道反应均出现于应用得希注射液后,根据临床表现提示为特希注射液致过敏性休克所致,本例患者无药物过敏史,从未用过得希注射液,今首次应用发生过敏性休克,因此,笔者认为临床医生在用此药时,应注意观察病情,以免发生不良反应。

收稿日期:1996-01-10