

达克宁霜致过敏性皮炎 1 例

张秀华 (温州医学院附属一院, 温州 325000)

患者朱者, 女, 35 a, 因脸部皮肤瘙痒于96年5月7日来我院就诊, 因考虑为真菌性皮炎, 医生给予达克宁霜局部外涂, Bid, 用药1天后皮肤出现红点, 因患者没考虑到为过敏性反应, 第二天继续用药, 结果脸部出现红肿, 眼睛浮肿, 并有灼烧

感, 红点增多成水疱状且有水样液体渗出, 10日患者来我院复诊, 经查诊断为达克宁霜过敏反应, 停药, 给予10%葡萄糖加先锋必素针5.0 g 静脉注射, 宽庚啉 2 mg, 4 id, 口服, 1:5000 呋喃西林湿敷, 连用三天, 水疱状消失, 破溃部位结痂, 红肿大大

好转, 停止静脉注射和呋喃西林湿敷, 改用3%硼酸溶液局部湿敷, 口服先锋Ⅳ胶囊0.375 g, tid, 7天后红肿完全消失。

达克宁霜(硝酸咪康唑霜)系西安杨森制药有限公司生产的外用霜剂, 每克含硝基咪唑20 mg, 为一广谱抗真菌药, 由于作用效果好, 副作用少, 深

受患者欢迎, 有关资料报道达克宁霜可用于五官皮肤的真菌感染, 而临床实践也证明了这一点, 鲜见过敏反应发生。本例患者用药单一, 无疑是达克宁霜引起的过敏性皮炎, 提示医生和患者谨慎用药, 特别是脸部皮肤用药。

收稿日期: 1996—08—08