

先锋四号胶囊引起的小儿口腔白斑1例

马哈太 向定亚 (新疆伊犁友谊医院, 伊宁 835000)

患者为男婴, 6 mo, 因咳嗽、发烧两天在门诊就诊, 查体: $T 38.5^{\circ}\text{C}$ 、两肺有清微的罗音, 诊断为早期肺炎, 予以抗炎镇咳治疗, 给予静滴 PC 三天 Qd, 口服先锋四号胶囊 0.625Tid , VitC 0.05Tid , 小儿止咳糖浆(自制) 5ml Tid 三天。三天后复诊, 患儿热退, 仍有少量的咳嗽, 医生建议停静滴, 继续口服先锋四号胶囊 $0.625\text{Tid} + \text{VitC } 0.05\text{Tid} + \text{小儿止咳糖浆 Tid } 5\text{ml}$ 。服药五天后口腔出现大片大片的白斑, 次日来儿科就诊, 诊断为先锋四号胶囊引起的细菌性白斑。

嘱立即停用此药, 口服复B片 Tid 一片 + $\text{V}_{\text{B}_{00}}$ 碾碎涂擦患处。三天后, 症状消失。

患儿口服先锋四号胶囊为中国扬州市第二制药厂生产, 批号为960430, 使用期为980430。该药抗炎效果显著, 但其副作用未见报导。因而, 笔者认为患儿免疫能力低下, 在使用抗生素过程中, 易出现人体中正常菌群失调。菌群失调常表现为腹泻、口腔炎、口腔白斑。因此在小儿使用抗生素时应引起注意。

收稿日期: 1997—03—03