

替硝唑致全身皮疹1例

汤凤英 (浙江省兰溪市人民医院, 兰溪 321100)

患者女性, 35岁, 既往无过敏史。因慢性胆囊炎、胆囊结石、胆总管结石入院手术治疗。术后给予环丙沙星0.2 Bid 静滴抗感染。3天后患者仍有发热, 即加用替硝唑400 mg, Bid 静滴。次日患者颈胸部、四肢瘙痒。查体见颈部、前胸、四肢散布黄豆大小红色斑丘疹, 压之褪色。诊断多形性红斑药疹(环丙沙星引起?)即予停环丙沙星、肌注非那根25 mg后症状缓解。第3天继用替硝唑、静滴半小时后患者全身多处瘙痒难忍。查体见头面部、颈部、后背部、腹部、四肢散布红色斑丘疹。故考虑为替硝唑过敏引起。即停用, 静推10%葡萄糖酸钙10 ml, 肌注非那根针25mg, 1小时后皮疹完全消

退。

1月后患者因牙周炎用替硝唑抗感染治疗, 半小时后出现全身散布小丘疹。经停用该药, 抗过敏治疗后皮疹消退。

讨论, 替硝唑(TINIDAZOLE), 属于硝基咪唑类化合物。其抗厌氧菌和杀灭滴虫作用强于灭滴灵。主要用于重度厌氧菌和外科手术厌氧菌感染的治疗和预防, 疗效好、付作用轻微。引起全身皮疹较为罕见。本例先后三次用替硝唑治疗, 均发生全身皮疹。故考虑替硝唑所致药疹。

收稿日期: 1997-03-20