

静点乳酸环丙沙星注射液致剥脱性皮炎1例

史学森 祁淑华 王志革 (包头市第四医院, 包头 014030)

李桂兰、女性, 48 a, 于1996年6月20日以急性胆囊炎收住院。入院时查体: $T: 38.4^{\circ}\text{C}$, $P: 100\text{次}/\text{min}$, $R: 25\text{次}/\text{min}$, $BP: 18/12\text{kPa}$, 急性痛苦面容, 心肺正常, 右上腹肌紧张, 莫非氏征阳性。轴查: $WBC: 25.2 \times 10^9/\text{L}$, BUS :-, 胆囊肿大, 胆囊壁增厚水肿, 壁毛糙。入院后立即给予禁食, 静点乳酸环丙沙星注射液(Ciprofloxacin, Lactate, Znjection 商品名希普欣), 200 mg, 每日二次, 能量合剂静点以及口服消炎利胆片, 654-I 等, 患者自觉右上眼痛, 腹胀明显好转, 胆囊区触痛明显减轻, 体温恢复正常。于输注

环丙沙星第13天, 自觉头部麻木, 周身瘙痒。查体见面部红, 粗糙, 头皮, 躯干、四肢及手足指趾端大量密积的红色丘疹, 次日自觉面部发紧, 口唇肿胀明显, 张口困难, 体温再次上升, 波动在 37.5°C — 38.5°C 之间, 查血象 $WBC: 16.2 \times 10^9/\text{L}$, 嗜酸细胞计数: 2320个, 急请皮肤科会诊, 考虑环丙沙星注射液引起药疹和发热, 立即停环丙沙星静点, 余治疗同前。另外给予痒苦乐民注射液20 ml + V_0 注射液1.0、iv、Qd, 强的松 30 mg, 每日一次口服以及息斯敏、赛庚啶等。全身皮肤开始由红变白, 面部肿胀减轻, 周身皮肤呈片状脱落, 手足掌面角

化皮肤呈大块状剥脱，裂开，部分指趾端皮肤脱落后见新鲜肉芽创面暴露，有渗血，及时给予包扎，换药。数日后，皮疹消退，血象恢复正常，没有发生继发感染。

环丙沙星为新型第三代喹诺酮类药物，具有抗菌谱广，疗效高，无需做过敏试验等优点。因此，在临床上得到广泛使用。它的主要付作用为恶心，

呕吐，腹痛，腹泻和厌食等消化道症状。另外，也可出现头痛、头昏，失眠等神经系统症状。皮疹的发生率相对少且轻，停药后即可消退。我们观察此例由药物所致剥脱性皮炎患者实属首见。查阅近期资料，未见有环丙沙星注射液引起剥脱性皮炎报导，其机制有待进一步探讨。

收稿日期：1996—08—07