

复方氯唑沙宗致药疹1例

李秀芹 张华芸 (山东烟台毓璜顶医院, 烟台 264000)

患者,男,66a,因肩周炎及风湿疼痛服用复方氯唑沙宗片(鲁南制药厂生产,批号950216),每日3次,每次2片。1wk后,患者出现皮肤瘙痒、发红,继而在双手背、双侧前臂、脚背及小腿等皮肤出现大片红斑,红斑有针尖大小和米粒大小淡红色小脓疱,边界清楚,稍突出皮肤表面,阴茎冠状沟有多个水泡环绕,阴茎及阴囊呈现大小不一的糜烂面,部分渗液,周边皮肤及龟头红,腹股沟淋巴结呈蚕豆样肿大并有压痛,肝肾区无叩击痛。T37.9℃,P82/min,R20次/min,BP17.2/12kPa。立即停服复方氯唑沙宗,静滴青霉素、氟美松,口服扑尔敏,局部外用抗菌消炎药,用药后,红斑逐渐消退,脓疱逐渐被吸收、脱屑,四肢皮肤大部分愈合,阴茎皮肤基本愈合。经继续治疗1wk后,以上症状全部消退,手背、前臂等部位遗留色

素沉着。后改用扶他林片剂治疗,无任何不良反应。为证实是复方氯唑沙宗引起药疹,嘱患者再次服用复方氯唑沙宗片(生产厂家和批号同上),每日3次,每次1片,并多饮水,观察,服药5d后,患者再次出现皮肤瘙痒,发红,症状同前,立即停药,并对症治疗,好转。

讨论 复方氯唑沙宗是肌肉松弛剂,对于治疗肌痉挛性疼痛为主的各种疾病,效果甚好。本药中含有氯唑沙宗125mg,扑热息痛150mg。为排除扑热息痛引起过敏,追问病史,患者平素无药物过敏史,曾多次服过扑热息痛及非甾体类消炎镇痛药,从未发生过过敏反应。患者两次服用复方氯唑沙宗,引起药疹,并潜伏期较长,应引起临床重视。

收稿日期:1997-04-16